

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

mucoaliv 200 mg polvo para solución oral acetilcisteína

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es **mucoaliv 200 mg polvo para solución oral** y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar **mucoaliv 200 mg polvo para solución oral**.
3. Cómo tomar **mucoaliv 200 mg polvo para solución oral**.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **mucoaliv 200 mg polvo para solución oral**.
6. Información adicional.

1. QUÉ ES mucoaliv 200 mg polvo para solución oral Y PARA QUÉ SE UTILIZA

mucoaliv 200 mg polvo para solución oral es un medicamento que actúa disminuyendo la viscosidad del moco, fluidificándolo y facilitando su eliminación.

Este medicamento está indicado para reducir la viscosidad de los mocos y flemas, facilitando su expulsión, en procesos catarrales y gripales.

2. ANTES DE TOMAR mucoaliv 200 mg polvo para solución oral

No tome mucoaliv 200 mg polvo para solución oral:

- Si es alérgico (hipersensible) a la acetilcisteína y sus derivados o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si padece úlcera de estómago o duodeno.

Tenga especial cuidado con mucoaliv 200 mg polvo para solución oral:

- Si es asmático o padece una enfermedad respiratoria grave, deberá consultar al médico antes de tomar este medicamento.
- El posible olor azufrado (a huevos podridos) del medicamento es propio del principio activo, pero no indica que el medicamento esté en malas condiciones.
- Durante los primeros días de tratamiento podrá observar un aumento de mocos y flemas que irá disminuyendo a lo largo del tratamiento.
- Si tras la administración de **mucoaliv 200 mg** se observa la aparición de molestias en el estómago deberá suspender el tratamiento y consultar al médico.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

No administrar conjuntamente con medicamentos antitusivos (para la tos) o con aquellos que reducen las secreciones bronquiales, ya que se puede producir una acumulación de moco fluidificado.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar al médico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas:

Debe utilizarse con precaución en aquellas personas cuya actividad requiera atención y que hayan observado somnolencia durante el tratamiento con este fármaco.

Información importante sobre alguno de los componentes de mucoaliv 200 mg polvo para solución oral:

Este medicamento puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria porque contiene aspartamo que es una fuente de fenilalanina.

Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene amarillo anaranjado S (E-110). Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

3. CÓMO TOMAR mucoaliv 200 mg polvo para solución oral

Siga exactamente las instrucciones de administración de **mucoaliv 200 mg polvo para solución oral** indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

mucoaliv 200 mg es un medicamento que se toma por vía oral. Los sobres de **mucoaliv 200 mg polvo para solución oral** se toman disueltos en un vaso de agua.

Se recomienda beber abundante cantidad de líquido durante el día.

Las dosis usuales son:

- Adultos:
Administrar 1 sobre (200 mg de acetilcisteína) por toma, 3 veces al día. No superar la dosis de 3 sobres (600 mg) al día.
- Pacientes entre 12 y 18 años:
Administrar 1 sobre (200 mg de acetilcisteína) por toma, 3 veces al día. No superar la dosis de 3 sobres (600 mg) al día.

Uso en niños:

No administrar este medicamento a niños menores de 12 años.

Si los síntomas empeoran o si persisten después de 5 días de tratamiento o se produce: fiebre, erupciones en la piel, dolor de cabeza persistente o dolor de garganta, debe consultar a un médico.

Si toma más mucoaliv 200 mg polvo para solución oral del que debiera:

Si ha tomado más de lo que debe consulte a su médico o farmacéutico o bien llame al Servicio de Información Toxicológica (teléfono: 91.5620420), indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Lleve este prospecto con usted si es posible.

Si olvidó tomar mucoaliv 200 mg polvo para solución oral:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **mucoaliv 200 mg polvo para solución oral** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En raras ocasiones puede aparecer somnolencia, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor y ardor de estómago, diarreas y erupción cutánea.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.


5. CONSERVACIÓN DE mucoaliv 200 mg polvo para solución oral

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Caducidad:

No utilice **mucoaliv 200 mg polvo para solución oral** después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de mucoaliv 200 mg polvo para solución oral:

- El principio activo es acetilcisteína.
- Los demás componentes son: aspartamo (E-951), aroma de naranja, colorante amarillo anaranjado S (E-110), manitol (E-421) y sílice coloidal anhidra.

Aspecto del producto y contenido del envase:

mucoaliv 200 mg es un polvo para solución oral. Se presenta en envases que contienen 20 sobres.

Titular y responsable de la fabricación:

Laboratorios Cinfa, S.A.
C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.
31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España

Este prospecto ha sido aprobado en Febrero 2012.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) www.aemps.gob.es/