



# IBERCAL<sup>®</sup> sobres

Pidolato de calcio

## COMPOSICIÓN

Pidolato de calcio ..... 3.750 mg = 500 mg Ca<sup>+2</sup>

Excipientes: manitol, macrogol 4000, ácido málico, ciclamato de sodio, aroma de naranja, sílice coloidal anhidra, sacarina de sodio, amarillo anaranjado E-110.

## PROPIEDADES

El pidolato cálcico (pirrolidón-carboxilato de calcio) es una sal de calcio que ha demostrado una notable actividad al ser metabolizada rápidamente y fijándose principalmente en el tejido óseo. Presenta buena tolerancia digestiva, incluso en tratamientos muy prolongados.

## INDICACIONES

- Tratamiento de los procesos donde esté indicado un aporte de Calcio (Osteoporosis, Tirotoxicosis, etc.).
- Tratamiento de los estados carenciales de Calcio.

## POSOLOGÍA

La dosificación se ajustará para obtener una dosis por día de 1 g a 1,5 g de calcio elemento.

En profilaxis de osteoporosis: 1 g de calcio elemento, lo que supone 2 sobres al día. En tratamiento de osteoporosis, ya establecida y diagnosticada: 1,5 g de calcio elemento que corresponde a 3 sobres al día.

## MODO DE EMPLEO

Disuélvase, agitando el contenido en un vaso con agua.

## PRECAUCIONES

En caso de asociaciones con vitamina D a elevadas dosis será indispensable un control periódico de los parámetros de calciuria/calcemia.

Este medicamento contiene colorante E-110 como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.



## CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal comprobada, hipercalcemias y predisposición a la calculosis.

## INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente diarrea, anorexia, náuseas u otros trastornos gastrointestinales, cefaleas, acaloramientos y muy raramente reacciones alérgicas.

## INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

No se ha descrito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica: Teléfono 91 562 04 20.

## PRESENTACIONES

Ibercal sobres: 20 sobres de granulado para solución oral.

Ibercal sobres: 30 sobres de granulado para solución oral.

**Sin receta médica.**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**

Merck Farma y Química, S.A.  
Polígono Merck  
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)



1235485-J

1235485-J