



CALCIO-20

Emulsión de fosfato tricálcico de fácil administración, excelente sabor y buena tolerancia digestiva incluso en tratamientos prolongados.

COMPOSICION.- Contenido total: 300 ml Por 100 ml

Principios Activos:

Fosfato tricálcico : 2.088 mg

Excipientes:

Parafina líquida, Carboximetilcelulosa sódica, Benzoato sódico, Sorbato potásico, Parahidroxibenzoato de metilo (sal sódica), Ciclamato sódico, Sacarina sódica, Esencias de curaçao, Limón y Piña y Agua purificada.

INDICACIONES.- Osteoporosis y osteomalacia. Calcioterapia en los estados deficitarios de Calcio y cuando se requiere cantidades suplementarias de este mineral. Crecimiento, dentición, caries múltiples, raquitismo, consolidación de fracturas, embarazo, y lactancia.

POSOLOGIA Y ADMINISTRACION.- Vía oral.

Teniendo en cuenta las distintas indicaciones terapéuticas de CALCIO-20, la dosis a administrar puede variar dentro de amplios márgenes. Como orientación se recomienda:

Adultos: 1 cucharada (15 ml) en las 3 principales comidas del día.

Niños: 2 cucharaditas (10 ml) en las 3 principales comidas del día.

1 cucharada = 15 ml = 125 mg de Calcio elemento.

2 cucharaditas = 10 ml = 83,3 mg de Calcio elemento.

Dada las necesidades diarias de Calcio elemento, CALCIO-20 puede administrarse durante períodos prolongados de tiempo.

ADVERTENCIA.- Advertencias sobre excipientes.

Por contener benzoato sódico como Excipiente puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia).

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.- Hipercalcemia, hipercalciuria, insuficiencia renal grave, calculosis. Evitar la administración de dosis superiores a las recomendadas durante el embarazo y a niños.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por el médico.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES.- La administración de Calcio reduce los niveles séricos de las tetraciclinas. El calcio eleva la toxicidad de la digital, pudiendo provocar intoxicación digitálica.

EFFECTOS SECUNDARIOS.- Estreñimiento.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO.- No se han descrito casos de intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Telf. 91 5620420.

PRESENTACION.- Frasco con 300 ml de emulsión.

«No sobrepasar la fecha de caducidad que figura en el envase»
«Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños»
«SIN RECETA MEDICA»



LABORATORIOS MADARIAGA

Electrónica, 7 - Polígono URTINSA II -28923 ALCORCON (Madrid)