



IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas Simeticona

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es IMONOGAS y para qué se utiliza
2. Antes de tomar IMONOGAS
3. Cómo tomar IMONOGAS
4. Posibles efectos adversos
5. Como conservar IMONOGAS
6. Información adicional

1. QUÉ ES IMONOGAS Y PARA QUE SE UTILIZA

IMONOGAS actúa rompiendo los gases atrapados que causan hinchazón.

Se utiliza para el tratamiento sintomático de los gases (flatulencia) en adultos.

2. ANTES DE TOMAR IMONOGAS

No tome IMONOGAS:

- Si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de IMONOGAS.

Tenga especial cuidado con IMONOGAS

Consulte a su médico si:

- no mejora después de 10 días de tratamiento
- tiene estreñimiento continuado.

Uso de otros medicamentos

La toma de este medicamento no afecta a la eficacia de otros medicamentos.

Toma de IMONOGAS con alimentos y bebidas

La toma de este medicamento con alimentos y bebidas no afecta a la eficacia del mismo.

Uso en niños

Los niños y adolescentes menores de 15 años no deben tomar este medicamento.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Aunque la simeticona no se absorbe en el tracto gastrointestinal, IMONOGAS no se puede tomar durante el embarazo ni tampoco las mujeres en período de lactancia.

Conducción y uso de máquinas:

La toma de IMONOGAS no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Información importante sobre algunos de los ingredientes de IMONOGAS

No aplicable

3. CÓMO TOMAR IMONOGAS

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

La dosis normal es:

Mayores de 15 años: Tome 1 cápsula después de cada comida principal (comida y cena). Este medicamento se toma por vía oral.

Trague la cápsula con un vaso grande de agua.

No tome el medicamento durante más de 10 días seguidos.

Si los síntomas empeoran o no mejoran en 10 días seguidos de tratamiento, debe suspenderlo y consultar al médico.

Si toma más IMONOGAS del que debiera

Consulte a su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame el Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20 (Indicando el medicamento y la cantidad ingerida).

Si olvida tomar IMONOGAS

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

En caso necesario tome 1 cápsula después de la siguiente comida principal.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos IMONOGAS puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Se han producido los siguientes efectos adversos aunque no se conoce con que frecuencia:

- Dolor abdominal, náuseas, estreñimiento
- Reacciones alérgicas, tales como erupción en la piel, picor, hinchazón de cara y lengua o dificultad para respirar.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto informe a su médico o farmacéutico.

5. CÓMO CONSERVAR IMONOGAS

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice IMONOGAS después de la fecha de caducidad que aparece en el blister o el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere precauciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudara a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de IMONOGAS:

El principio activo es Simeticona. Cada cápsula contiene 240 mg de simeticona.

Los demás componentes son gelatina y glicerol (E 422).

Aspecto del producto, y contenido del envase:

IMONOGAS son cápsulas blandas de gelatina transparente. Cada envase contiene 10, 20 ó 30 cápsulas. Puede que solo estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:**Titular de la autorización:**

JOHNSON & JOHNSON S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7. 28042-Madrid. España

Responsable de la fabricación:

Catalent France Beinheim S.A.

74 rue Principale

67930 Beinheim, Francia

Este medicamento está autorizado en otros países bajo las siguientes denominaciones:

Dinamarca: IMOGAS

Suecia: IMOGAS 240 mg kapsel, mjuk

Finlandia: IMOGAS 240 mg pehmeä kapseli

Noruega: IMOGAS kapsel, 240 mg

Irlanda: IMOGAS 240 mg Soft Capsules

Bélgica: IMONOGAS 240 mg zachte capsules

Luxemburgo: IMOGAS

Islandia: IMOGAS 240 mg hylki, mjúk

España: IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas

Portugal: IMOGAS 240 mg, capsulas moles

Este prospecto ha sido aprobado en Marzo 2011**Consejos de Educación Sanitaria**

Problemas digestivos:

Indigestión:

Se puede producir si usted:

Come demasiado

Come comidas ricas en grasas

Come demasiado rápido, sin masticar

Bebe demasiado alcohol con las comidas

Trate de evitar estos desencadenantes

Gases (flatulencia):

Con algunas comidas es más probable la aparición de gases porque:

Contienen aire por sí mismas (por ejemplo bebidas gaseosas, pan fresco)

Contienen altos niveles de carbohidratos los cuales no se absorben (por ejemplo, verduras secas, repollo, verduras crudas, cebollas)

Trate de evitar estas comidas

Consulte a su médico o farmacéutico si necesita más información.