



IMONOGAS 120 mg cápsulas blandas Simeticona

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted

Este medicamento puede obtenerse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe de utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días, debe consultar a un médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. **Qué es IMONOGAS y para qué se utiliza**
2. **Antes de tomar IMONOGAS**
3. **Cómo tomar IMONOGAS**
4. **Posibles efectos adversos**
5. **Conservación de IMONOGAS**
6. **Información adicional**

1. QUÉ ES IMONOGAS Y PARA QUE SE UTILIZA

Este medicamento actúa rompiendo los gases atrapados que causan hinchazón.

Esta indicado para el tratamiento sintomático de los gases (flatulencia) en adultos.

2. ANTES DE TOMAR IMONOGAS

No tome IMONOGAS:

- si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de IMONOGAS

Tenga especial cuidado con IMONOGAS:

Consulte a su médico si:

- No mejora después de 10 días de tratamiento
- Tiene estreñimiento que no mejora.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia pueden tomar Imonogas 10 mg ya que este medicamento no se absorbe.

Conducción y uso de maquinas:

IMONOGAS no tiene efectos conocidos sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinas.

3. CÓMO TOMAR IMONOGAS

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

La dosis normal es:

Adultos:

Tomar 1 cápsula, después de cada una de las principales comidas.

Vía oral.



Ingiera la cápsula con una cantidad suficiente de líquido, preferentemente un vaso de agua, nunca con zumo de pomelo o leche.

No tomar más de 4 cápsulas (500 mg) al día.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días, debe suspender el tratamiento y acudir al médico.

Si toma más IMONOGAS del que debiera: consulte a su médico a farmacéutico

Si olvidó tomar IMONOGAS: Tome una cápsula después de la siguiente comida principal. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos IMONOGAS puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de la Simeticona se han observado los siguientes efectos adversos con una frecuencia no conocida:

- Náuseas, estreñimiento
- Reacciones alérgicas, tales como erupción cutánea, picor, hinchazón de cara y lengua o dificultad para respirar.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE IMONOGAS

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Caducidad

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blister o el estuche. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben de tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudara a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de IMONOGAS:

El principio activo es Simeticona. Cada cápsula contiene 120 mg de simeticona.

Los demás componentes (excipientes) son: gelatina y glicerol (E- 422).

Aspecto del producto, y contenido del envase:

IMONOGAS son cápsulas blandas de gelatina transparente. Cada envase contiene 20, 40 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

Titular de la autorización:

JOHNSON & JOHNSON S.A.

Pº de las Doce Estrellas, 5-7

28042 - MADRID

Responsable de la fabricación:

Cardinal Health, 74 rue Principale.

67930 Beinheim, Francia

Este prospecto ha sido aprobado en Junio 2007

Consejos de Educación Sanitaria

¿Qué hacer si usted tiene problemas digestivos?

Indigestión:

Puede tener problemas si usted:

Come demasiado

Come comidas ricas en grasas



Come demasiado rápido, sin masticar
Bebe demasiado alcohol con las comidas
Trate de evitar estos desencadenantes.

Gases (flatulencia):

Con algunas comidas es más probable la aparición de gases porque:

Contienen aire por sí mismas (por ejemplo bebidas gaseosas, pan fresco)

Contienen altos niveles de carbohidratos los cuales no se absorben (por ejemplo, verduras secas, repollo, verduras crudas, cebollas)

Trate de evitar estas comidas

Consulte a su médico o farmacéutico si necesita más información.