

**Viscotears®**  
**Gel líquido**

Carbómero

**COMPOSICIÓN POR GRAMO**

Carbómero (DCI) 2 mg. Excipientes: cetrimida 0,1 mg, sorbitol, hidróxido sódico, y agua para inyección.

**FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**

Gel líquido oftálmico. Envase de 10 gramos.

**ACTIVIDAD**

El gel Viscotears es un lubricante ocular altamente viscoso, claro y capaz de formar gotas. Después de su aplicación local sobre el ojo forma una película protectora de alta adherencia y larga duración.

**TITULAR Y FABRICANTE**

**TITULAR**

Novartis Farmacéutica, S.A.  
Gran Vía de les Corts Catalanes, 764  
08013 Barcelona / España

**FABRICADO POR**

Dr. Gerhard Mann  
Brunsbütteler Damm 165-173 D-13581 Berlín/Alemania

**INDICACIONES**

Alivio sintomático de la sequedad ocular.

**CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad conocida a cualquier componente del gel. En caso de inflamación del iris o enfermedades corneales, consultar al médico que será quien determine la posibilidad o no del uso de Viscotears como tratamiento.

**PRECAUCIONES**

Si aparece dolor ocular, cambios en la visión, enrojecimiento o irritación ocular continuada o si las condiciones empeoran o el alivio no se produce en 3 días, discontinuar el tratamiento y consultar con el médico.

Si utiliza lentes de contacto blandas, se aconseja retirarlas antes de la instilación del gel, pudiendo ser colocadas de nuevo pasados unos minutos.

**INTERACCIONES**

No se han descrito

**ADVERTENCIAS**

- **Embarazo y lactancia.** No se han descrito advertencias especiales.
- **Efectos sobre la capacidad de conducción.** En el caso de presentarse visión borrosa se recomienda abstenerse de conducir automóviles o cualquier otro tipo de máquina.
- **Uso en niños.** Ajustarse estrictamente a las recomendaciones médicas.

## **POSOLOGÍA**

Vía oftálmica. La frecuencia de aplicación depende de la necesidad de cada paciente. Por término medio, es de una gota 3-4 veces al día. En determinadas patologías y según criterio facultativo, Viscotears puede aplicarse con mayor frecuencia.

## **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**

Para la administración abrir el envase, con las manos recién lavadas, procurando que el tapón y el tubo no toquen ninguna superficie.

El tubo se mantiene verticalmente (*figura ilustrativa de la posición del tubo incorrecta y correcta*). Entonces, se origina una gota, que se separa fácilmente de la abertura. Con la cabeza inclinada hacia atrás, separar hacia abajo el párpado inferior e instilar una gota en el saco conjuntival (espacio entre el ojo y el párpado) mientras se dirige la mirada hacia arriba. Cerrar los ojos suavemente y mantenerlos cerrados durante unos instantes.

Después de la administración se recomienda presionar con la punta del dedo el conducto lagrimal localizado junto a la nariz. Como resultado se obtiene una mejor eficacia y al mismo tiempo reduce el riesgo de efectos secundarios.

Antes de usar otros medicamentos oftálmicos esperar como mínimo 5 minutos, el gel Viscotears debe ser siempre la última medicación instilada. Por tratarse de especialidades estériles, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- Cada paciente utilizará su propio envase.
- La aplicación del gel deberá realizarse con la máxima pulcritud, evitando en lo posible cualquier contacto con el tubo (por ejemplo: párpado, dedos, etc.)
- Después de cada aplicación cerrar bien el envase.
- Finalizado el tratamiento deberá desecharse el medicamento aunque no se haya consumido en su totalidad.

## **SOBREDOSIS**

Dada su vía de administración exclusivamente tópica, no se prevé su posibilidad. En caso de ingestión accidental acudir al médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono (91) 5620420 indicando el producto y la cantidad ingerida.

## **REACCIONES ADVERSAS**

Puede producirse sensación pasajera de quemazón tras la instilación y adhesión de los párpados. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

## **CONSERVACIÓN**

Mantener el envase bien cerrado.

## **CADUCIDAD**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Una vez abierto, deberá usarse durante el periodo de tratamiento establecido por el médico y como máximo desechar a los 30 días.

## **LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**TEXTO REVISADO:** Diciembre 2000