

SOLUCIÓN TÓPICA

**LINDEMIL®**



**COMPOSICIÓN por 100 ml:**

Benzalconio cloruro ..... 600 mg

Sulfato aluminico potásico dodecahidrato ..... 8 g

Excipientes: etanol (1% v/v), esencia floral, azul de metileno, levomentol, eucaliptol, salicilato de metilo, agua purificada, c.s.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Contiene un activo antiséptico de superficie, cloruro de benzalconio, derivado de amonio cuaternario, de acción bactericida y germicida y de fácil penetración tisular. A ella se une la suave actividad astringente del sulfato aluminico potásico, en un vehículo de agradable fragancia.

**INDICACIONES**

Antisepsia e higiene vulvovaginal.

Vaginitis inespecíficas.

Coadyuvante de los tratamientos específicos de las infecciones por *Trichomonas* spp. y *Candida* spp.

**POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO**

Uso tópico vaginal.

Añadir 1-2 cucharadas a cada litro de agua templada.

Dosis 1-2 lavados diarios.

**CONTRAINDICACIONES**

No se han descrito.

**INCOMPATIBILIDADES**

Incompatible con detergentes aniónicos.

**ADVERTENCIAS**

**Advertencia sobre excipientes:**

Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.

#### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Siguiendo las pautas de administración, no se observan efectos secundarios.

#### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de intoxicación por ingestión accidental, realizar vaciamiento gástrico y aplicar tratamiento sintomático, manteniendo las constantes circulatorias y respiratorias.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

#### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener el producto en su envase al abrigo de la luz.

#### **PRESENTACIONES**

Frasco de 500 ml

Frasco de 100 ml

#### **SIN RECETA MÉDICA.**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.**

#### **ABBOTT LABORATORIES, S.A.**

Avenida de Burgos, 91 - 28050 Madrid.

**Texto revisado:** 02/2002.