



garydol
Comprimidos para chupar

COMPOSICIÓN:

	Por comprimido
Benzocaína	2 mg
Dihidrocloruro de clorhexidina	5 mg
Excipientes: aroma de menta, estearato de magnesio, povidona, sacarina de sodio, sorbitol y talco.	

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO:

Envase de 20 comprimidos para chupar

ACTIVIDAD:

GARYDOL es una especialidad que por sus componentes activos es efectiva para el tratamiento de las afecciones bucofaríngeas. La clorhexidina es un antiséptico y la benzocaína alivia de inmediato el dolor.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR Y DEL FABRICANTE:

LABORATORIOS CINFA, S.A.
C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Areta.
31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España

INDICACIONES:

Alivio sintomático de las afecciones leves bucofaríngeas.

CONTRAINDICACIONES:

El preparado está contraindicado en pacientes que previamente hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES:

- No utilizar más de 2 días, ni en niños menores de 3 años, sin consultar al médico.
- En caso de agravación o persistencia de los síntomas, o si éstos van acompañados de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consultar con el médico lo antes posible.

INTERACCIONES:

No utilizar junto con sulfamidas ni con inhibidores de la Colinesterasa.

ADVERTENCIA:

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

- Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.
- Este medicamento contiene 895 mg de sorbitol como excipiente por comprimido. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

**POSOLOGÍA:**

Adultos y niños mayores de 3 años: disolver lentamente en la boca un comprimido, 4 ó 5 veces al día, o si fuera necesario 1 comprimido cada 2 horas sin sobrepasar los 8 comprimidos al día. Los comprimidos no deben masticarse.

SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:

Por ingestión accidental de grandes dosis: náuseas, dolores abdominales, somnolencia o desmayos.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica (teléfono 91 562 04 20), indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente pueden aparecer reacciones locales a preparados de clorhexidina. En casos muy aislados se han descrito reacciones alérgicas generalizadas a clorhexidina. También se han comunicado reacciones hipersensibles a benzocaína.

Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
--

TEXTO REVISADO: Marzo 2001