

ANTIGRIETUN

COMPOSICIÓN

Principios activos:	%	por envase
Alantoína	2,00	0,600 g
9-aminoacridina	0,07	0,021 g
Prednisolona	0,05	0,015 g
Bálsamo del Perú	1,00	0,300 g

Excipientes:

Nipagín, aceite de oliva, oleato de decilo, alcohol cetilestearílico, colorante rojo A4, vainillina, esencia de rosas, polietilenglicol 400, agua desionizada, c.s.p.....	100	30,00 g
---	-----	---------

INDICACIONES

Quemaduras superficiales. Eritema solar. Hiperqueratosis de manos y pies. Preventivo y curativo de las grietas de la mama (último trimestre del embarazo y durante la lactancia). Dermatitis secas profesionales. Eczemas microbianos y micóticos en su fase final. Hemorroides, fisuras y prurito anal. Perniosis.

DOSIFICACIÓN

Como norma general, 2 ó 3 aplicaciones al día sobre la superficie a tratar. Dependiendo del estado y evolución de la afección, se podrá variar la cantidad y frecuencia de las aplicaciones. En las grietas de la mama, como profiláctico, 1 vez al día. En la lactancia, sistemáticamente después de cada tetada.

CONTRAINDICACIONES

Procesos tuberculosos o víricos cutáneos, úlceras cutáneas.

PRECAUCIONES

En el tratamiento de las grietas mamarias durante la lactancia, deberá limpiarse la zona impregnada antes de cada mamada.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES

No se han descrito.

INTOXICACIONES Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

ADVERTENCIA

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control del dopaje como positivo.

PRESENTACIÓN

Tubo conteniendo 30 gramos de pomada.

CON RECETA MÉDICA

LABORATORIOS CASEN-FLEET, S. A.
UTEBO (Zaragoza)

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS