

aftasone BC

Composición

Hidrocortisona hemisuccinato (DCI).....	2,5 mg
Piridoxina (DCI)	200 mg
Riboflavina (DCI)	15 mg
Ascórbico, ácido (DCI)	250 mg
Excipientes: lactosa, povidona, talco, ácido esteárico, esencia de naranja, ácido tartárico, sacarina sódica	c.s.p. un comprimido

Indicaciones

La acción más eficaz se manifiesta en el tratamiento de las úlceras aftosas de la boca, sea cual fuere su localización.

Resulta también sumamente útil en las ulceraciones bucales por causas cáusticas.

Posología

De 3 a 4 comprimidos al día.

Normas para la correcta administración

Dejar disolver un comprimido de Aftasone BC en la boca, en las proximidades de la ulceración. En caso de que ésta sea múltiple, lo mejor es succionar el comprimido para que la saliva sirva de medio de transporte del medicamento y éste alcance a todas las ulceraciones.

La permanencia del comprimido en la boca debe ser de unos 15 a 30 minutos, como promedio, pero a veces se dan casos particulares en que, por motivos fisiológicos, personales o composición variada de la saliva, los comprimidos tardan más en disolverse. En tales casos recomendamos succionar el comprimido como si se tratara de un caramelo, para activar su disolución.

Contraindicaciones

Úlcera de origen vírico.

Precauciones

No se han descrito.

Interacciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Intoxicación y tratamiento

Las características de esta especialidad hacen prácticamente imposible la intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono (91) 562 04 20.

Condiciones de conservación

Conviene conservar el producto en lugar fresco y seco.

Presentación

Se presenta en cajas de 12 comprimidos.

Sin receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



Director Técnico, A. Buxadé Viñas
Laboratorios Viñas sa
Provenza, 386 - 08025 Barcelona