

DERMOMYCOSE

LÍQUIDO

Solución tópica

COMPOSICIÓN:

Por ml:	
Fuchsina básica	0,0927 mg
Acido bórico	8 mg
Fenol	16 mg
Resorcinol	80 mg
Excipientes: acetona 40 mg 8% de etanol, agua destilada, c.s.e.	

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

Solución Frasco con 50 ml.

ACTIVIDAD:

Actúa en la prevención y tratamiento tópico de lesiones cutáneas micóticas, microbianas y mixtas.

TITULAR Y FABRICANTE:

Laboratorio Reig Jofré S.A.
Avda. Gran Capità, 10
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

INDICACIONES:

Profilaxis de infecciones cutáneas.
Profilaxis del impétigo y otras infecciones de la piel del lactante y primera infancia.
Epidermicosis a saprofitias.
Pitiriasis versicolor.
Epidermicosis: eczema marginado de Hebra, eczema micótico de pies (pie de atleta) y manos.
Micosis infectadas secundariamente.
Eczemas microbianos.

CONTRAINDICACIONES:

Aunque no se han descrito, DERMOMYCOSE LIQUIDO está contraindicado en aquellas personas que presenten reacciones alérgicas a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES:

En caso de que la lesión sea de tipo eczematoides, conviene aplicar previa o simultáneamente una pomada con corticoide.

Si apareciesen reacciones alérgicas suspender la aplicación y consultar a su médico o farmacéutico.

No aplicar sobre heridas.

ADVERTENCIAS:

- Embarazo y lactancia: No se han descrito por vía tópica dermatológica.

- Advertencias sobre excipientes:

Por contener etanol como excipiente las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.

POSOLOGIA:

Solución de administración por vía tópica.

Aplicar sobre la zona a tratar 1-2 veces al día.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PREPARADO:

Aplicar DERMOMYCOSE LIQUIDO, pincelando o mojado la parte afectada con un algodón empapado.

SOBREDOSIS:

No existe posibilidad de sobredosificación por la vía de administración propia de la especialidad.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico y/o consultar al Servicio de Información Toxicológica teléfono 91- 562 04 20 indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS:

No se han descrito, pero sí se produce cualquier reacción adversa atribuible a la administración tópica del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Si la zona afectada presenta grietas o esconaciones, por efecto del frascado, la primera aplicación de DERMOMYCOSE LIQUIDO puede ser ligeramente molesta.

CONSERVACION:

No requiere condiciones especiales de conservación. Mantener el frasco bien tapado.

CADUCIDAD:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A.

Avda. Gran Capità, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona).

3306-01