

# Cinfatós 10 mg/5 ml jarabe

Dextrometorfano-Dextromethorphan

JARABE - SYRUP

## COMPOSICIÓN:

	<b>Por ml</b>	<b>Por unidad de toma (5ml)</b>
Dextrometorfano (DCI) Bromhidrato	2,0 mg	10,0 mg
Sacarina sódica	2,5 mg	12,5 mg
Sorbitol	400,0 mg	2000,0 mg
Ácido cítrico monohidrato, Aroma naranja, Benzoato sódico, agua desmineralizada.		

## PROPIEDADES:

El bromhidrato de dextrometorfano tiene una acción inhibidora específica y pronunciada sobre la irritación del centro de la tos, por lo que es eficaz frente a diversas formas de tos. No tiene acción narcótica ni analgésica.

## INDICACIONES:

Antitusivo, tratamiento sintomático de todas las formas improductivas de tos (tos irritativa, tos nerviosa).

## POSOLOGÍA:

Adultos: 1 medida de 5-10 ml (10-20 mg) cada 4-6 horas. Máximo al día 120 mg (60 ml).

Niños de 6 a 12 años: 1 medida de 2.5-5 ml (5 a 10 mg) cada 4-6 horas. Máximo al día 60 mg (30 ml).

Niños de 2 a 6 años: Existen otras presentaciones más adecuadas para ese grupo de edad (p.e. Cinfatos Infantil).

## ADVERTENCIAS PARA EL PACIENTE:

- Consulte a su médico si la tos persiste más de una semana o si va acompañada de fiebre alta, erupciones en la piel o dolor de cabeza persistente.
- No administrar a niños menores de seis años sin indicación del médico.
- No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, asma o enfisema, o cuando la tos va acompañada de abundantes secreciones.

- Esta especialidad contiene como excipiente 2 g de sorbitol por 5 ml de **cinfatós 10 mg/5ml jarabe**. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Se han descrito casos de abuso con medicamentos que contienen dextrometorfano en adolescentes, por lo tanto deberá tenerse en cuenta esta posibilidad, debido a que pueden ocasionarse efectos adversos graves (ver apartado Si toma más cinfatós 10 mg/5 ml jarabe del que debiera).

### **CONTRAINDICACIONES:**

- Hipersensibilidad al dextrometorfano.
- Insuficiencia respiratoria.
- Tos asmática.

### **EFECTOS SECUNDARIOS:**

- Raramente pueden aparecer somnolencia o molestias gastrointestinales. En ese caso es aconsejable reducir la posología.
- El consumo simultáneo de alcohol durante el tratamiento puede acentuar la aparición de efectos secundarios. No ingerir bebidas alcohólicas durante el mismo.

### **PRECAUCIONES:**

- Durante el tratamiento puede aparecer, en raras ocasiones, una disminución de la capacidad de reacción o somnolencia, que habrá de tenerse en cuenta en caso de conducir automóviles o manejar maquinaria peligrosa.
- Debe administrarse con precaución en pacientes con enfermedades hepáticas.

### **INTERACCIONES:**

No debe administrarse junto con ciertos medicamentos antidepresivos (IMAO) por lo que, si se encuentra en tratamiento con alguno de ellos, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### **INTOXICACIONES Y SU TRATAMIENTO:**

Los signos de sobredosificación se manifiestan con confusión, excitabilidad, inquietud, nerviosismo e irritabilidad.

La ingestión accidental de dosis muy altas puede producir en los niños un estado de sopor o alteraciones en la forma de andar. Estos efectos desaparecen mediante la inducción al vómito y lavado gástrico.

En caso de depresión respiratoria, administrar naloxona y asistencia respiratoria.

En caso de convulsiones, administrar benzodiazepinas I.V. o rectal, en función de la edad.

Se han producido casos de abuso con medicamentos que contienen dextrometorfano, pudiendo aparecer efectos adversos graves como: ansiedad, pánico, pérdida de la memoria, taquicardia (aceleración de los latidos del corazón), letargo, hipertensión o hipotensión (tensión alta o baja), midriasis (dilatación de la pupila del ojo), agitación, vértigo, molestias gastrointestinales, habla farfullante, nistagmo (movimiento incontrolado e involuntario de los ojos), fiebre, taquipnea (respiración superficial y rápida), daño cerebral, ataxia (movimientos descoordinados), convulsiones, depresión respiratoria, pérdida de conciencia, arritmias (latidos irregulares del corazón) y muerte.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Tfno.: (91) 562 04 20.

### **PRESENTACIÓN:**

Envase con 125 ml o 200 ml de jarabe.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**