

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
Thrombescina comprimidos de liberación prolongada®
Extracto de *Aesculus hippocastanum*

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta,. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran, o si persisten después de **4 semanas** de tratamiento, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

En este prospecto se explica:

- 1.- Qué es THROMBESCINA y para qué se utiliza
- 2.- Antes de tomar THROMBESCINA
- 3.- Cómo tomar THROMBESCINA
- 4.- Posibles efectos adversos
- 5.- Conservación de THROMBESCINA
- 6.- Información adicional

1.- QUÉ ES THROMBESCINA Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Thrombescina aumenta la resistencia capilar, mejora el tono venoso y la velocidad del flujo sanguíneo.

Thrombescina está indicado para el alivio temporal de los síntomas en piernas con varices tales como dolores, sensación de pesadez, hormigueo, calambres nocturnos y prurito.

2.- ANTES DE TOMAR THROMBESCINA

No tome Thrombescina:

- Si es usted alérgico a las semillas de *Aesculus hippocastanum* (Castaño de Indias) o a cualquier otro de los componentes del medicamento.
- Si tiene menos de 12 años.

Tenga especial cuidado con Thrombescina:

- Si usted está utilizando vendas elásticas o medias de compresión, no las deje de usar sin consultar a su médico.
- Se recomienda la consulta inmediata al médico, cuando, al administrar Thrombescina, en los casos de problemas causados por varices y en una sola pierna, se manifestara una reacción súbita que se caracteriza por aparición de edema, coloración de la piel o sensaciones de tensión, calor o dolor, ya que pueden ser síntomas de una enfermedad grave. Si los síntomas persisten o empeoran después de 4 semanas de tratamiento, a pesar de tomar regularmente la dosis recomendada, debe consultar a su médico.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Importante para la mujer:

Si está usted embarazada o cree que pueda estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o para el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Conducción y uso en máquinas:

No se han descrito.

3.- CÓMO TOMAR THROMBESCINA

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde tomar su medicamento.

Adultos y niños mayores de 12 años:

- Tomar 1 comprimido recubierto dos veces al día.
- Para obtener un efecto óptimo se recomienda de 4 a 8 semanas de tratamiento.
- Es aconsejable que las tomas se realicen siempre a las mismas horas.
- Los comprimidos deben ser ingeridos enteros, sin masticar.
- Se recomienda beber un vaso de agua con cada toma.
- Si estima que la acción de Thrombescina es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si toma más Thrombescina del que debiera:

En casos de sobredosis o ingestión accidental de cantidades grandes de Thrombescina, acuda inmediatamente a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Thrombescina:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4.- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, Thrombescina puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En raras ocasiones pueden presentarse náuseas, picor y alteraciones gastrointestinales.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informa a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE THROMBESCINA

Mantener Thrombescina fuera del alcance y de la vista de los niños.

Condiciones de conservación

- Conservar protegido de la humedad.
- No conservar a temperatura superior a 25°C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

Caducidad de Thrombescina:

No use este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Thrombescina:

El principio activo es extracto de *Aesculus hippocastanum* 263,2 mg de extracto seco, obtenido con etanol al 58% v/v, de semillas de *Aesculus hippocastanum* (Castaño de Indias) (relación planta seca / extracto: 4,5-5,5 : 1), estandarizado a 50 mg de glicósidos triterpénicos, calculados como Escina desprovista de agua.

Los demás componentes son: Calcio hidrogenofosfato, dióxido de silicio altamente dispersado, derivados del ácido poliacrílico, trietilcitrate, polisorbato 80, povidona, crospovidona, estearato de magnesio, hipromelosa, macrogol 4000, emulsión de dimeticona, talco, sacarina sódica, vainillina y colorantes dióxido de titanio (E-171) y óxido de hierro (III) / óxido de hierro hidratado (E-172).

Aspecto del producto y contenido del envase:

Thrombescina se presenta en forma de comprimidos de liberación prolongada y recubiertos con película. Cada envase contiene 50 comprimidos.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

LACER, S.A.; Sardenya, 350; 08025 Barcelona (España)

Este prospecto se ha aprobado en:

Abril 2004. Versión abril 2008.



LACER, S.A. SARDENYA, 350
08025 BARCELONA ESPAÑA