

PROSPECTO TANAGEL CÁPSULAS

Laboratorios Francisco Durbán, S.A.
Polígono Ind, La Redonda, c/ IX, nº 75-76
04710 El Ejido (Almería)

Vía Oral

PRESENTACIÓN

Blister con 15 cápsulas

COMPOSICIÓN (por comprimido)

Tanato de gelatina	500 mg
Extracto de opio	10 mg
Extracto de belladona	5 mg
Almidón	375 mg

INTRODUCCIÓN

El Tanato de gelatina está admitido como el mejor antidiarreico tánico por asegurar la llegada al intestino de todo el tanino que entra en su composición, al pasar inalterable por el medio ácido del estómago, descomponiéndose en tanino y gelatina en el medio alcalino del intestino.

El tanino se combina con sustancias albuminoideas y mucilaginosas del contenido intestinal, neutralizando así muchos productos del catarro de las paredes enterocólicas, que a su vez habrían de obrar sobre la mucosa de las mismas, manteniendo su irritación en el círculo vicioso que, en este aspecto, constituye todo catarro intestinal,

Además la gelatina obra protegiendo mecánicamente la mucosa inflamada contra los ácidos y álcalis que las fermentaciones bacterianas o putrefacciones producen en el trayecto entérico.

En el **TANAGEL CÁPSULAS** la acción antidiarreica del Tanato de Gelatina está complementada por la acción del Extracto de opio, que actúa como analgésico y relajante de la musculatura de fibra lisa del intestino, disminuyendo su motilidad y del Extracto de belladona, por su acción antiespasmódica e inhibidora de las secreciones.

INDICACIONES

Todas las diarreas del adulto, dispepsias, gastroenteritis, colitis, disentería, tuberculosis.

POSOLOGÍA

De 4 a 6 cápsulas al día.

CONTRAINDICACIONES

Estados convulsivos. Casos de insuficiencia renal y hepática, en fases terminales. Pancreatitis. Estenosis pilórica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Rara vez puede producirse sequedad en la boca y somnolencia..

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito

ADVERTENCIA

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico positivo en control de dopaje

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO

No se han descrito cuadros de intoxicación con éste preparado.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Las normales.

Los medicamentos deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al
SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
TELÉFONO 91 5620420