

HEPRO

FORMULA

Principios activos:

9-aminoacridina.....	9 mg
Hemisuccinato de hidrocortisona.....	36 mg
Alantoína.....	360 mg
Lidocaína clorhidrato.....	300 mg

Excipientes:

Metilparaben, Aceite de oliva, Lanette N, Mentol,
Dimetilpolisiloxano, Polisorbato 80 y
Agua desionizada c.s.p. 1 canuleta

INDICACIONES

Adultos: Hemorroides internas y externas, excepto en fase trombótica. Criptitis y papilitis. Prurito anal. Rectitis agudas y crónicas. Fisuras anales.

Niños: Prurito anal. Rectitis agudas y crónicas. Fisuras anales. Pólipos rectales.

DOSIFICACIÓN

Adultos: Una o dos canuletas diarias, preferentemente aplicada después de las deposiciones.

Niños: una canuleta diaria, preferentemente aplicada después de la deposición, y en menores de 4 años aplicar sólo media canuleta.

NORMAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN

Agitar las canuletas antes de su aplicación.

Una vez quitado el capuchón, introducir la cánula, en toda su longitud, en el recto; hacer presión para ir aplicando el medicamento a la vez que, lentamente, se va sacando la cánula y, finalmente, impregnar la zona externa del ano hasta terminar todo su contenido.

CONTRAINDICACIONES

Procesos tuberculosos o luéticos de la zona de aplicación.

PRECAUCIONES

Se deberá tener precaución en los tratamientos simultáneos con corticoides por vía general.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES

No se han descrito.

EFECTOS SECUNDARIOS

El uso prolongado puede producir, en casos aislados, efectos sistémicos de corticoides.

INTOXICACIONES Y SU TRATAMIENTO

La intoxicación por sobredosis o administración masiva es prácticamente imposible ya que, por reflejo normal, la ampolla rectal no permitiría la retención de un gran volumen, como sería necesario administrar para que apareciese un comienzo de intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica en el teléfono 91 562 04 20.

ADVERTENCIA

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control del dopaje como positivo.

PRESENTACIÓN

Cajas con 5 y 10 canuletas.

SIN RECETA MÉDICA

LABORATORIOS CASEN-FLEET, S. A.
UTEBO (Zaragoza)

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS