

HIBISCRUB **Clorhexidina 4%**

COMPOSICIÓN POR ML: **Principio activo:** Digluconato de Clorhexidina (D.C.I.) 0,04 g. **Excipientes:** Poloxámero 237, sol. Herbacol 15.393/T, D-gluconolactona y agua purificada.

ACTIVIDAD: Antimicrobiano.

INDICACIONES: Desinfección pre-operatoria de las manos en cirugía, lavado antiséptico de las manos en hospitales y antisepsia pre-/post-operatoria de la piel en pacientes sometidos a cirugía.

CONTRAINDICACIONES: Pacientes con hipersensibilidad a la Clorhexidina.

PRECAUCIONES: Evitar contacto con los ojos, cerebro, meninges y oído medio. En pacientes con lesiones de cráneo, raquídeas o perforación timpánica, valorar el beneficio del uso pre-operatorio del preparado frente al riesgo de contacto.

INTERACCIONES: Blanqueadores con hipoclorito pueden causar manchas de color pardo en tejidos previamente en contacto con Clorhexidina. Esta es incompatible con jabón y otros agentes aniónicos.

ADVERTENCIAS: **Advertencia sobre excipientes:** Este medicamento contiene ponceau 4R como excipiente. Pueden causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

POSOLOGIA: **desinfección pre-operatoria de las manos en cirugía:** Mojar manos y antebrazo, aplicar 5 ml de HIBISCRUB y lavar durante 1 min. , limpiando uñas con cepillo, enjuagar y aplicar otros 5 ml durante 2 min. ; enjuagar y secar. **Lavado antiséptico de las manos en hospitales:** Mojar manos y antebrazos, aplicar 5 ml de HIBISCRUB y lavar durante 1 min.; enjuagar y secar. **Antisepsia pre-operatoria de la piel en pacientes sometidos a cirugía:** Lavar todo el cuerpo (baño o ducha) por lo menos 2 veces, habitualmente el día antes y el de la operación en la forma siguiente: El día antes de operar lavar con 25 ml de HIBISCRUB, desde la cara y en sentido descendente, prestando atención a las áreas circundantes de la nariz, axilas, ombligo, ingles, y perineo. A continuación enjuagar y repetir el lavado con otros 25 ml, incluyendo el cabello. Finalmente, enjuagar y secar. Este procedimiento se repetirá al día siguiente. Para pacientes encamados, aplicar la técnica habitual de lavado en cama. Realizar la desinfección convencional de la zona operatoria con el paciente en el quirófano. **Antisepsia post-operatoria de la piel en pacientes sometidos a cirugía:** A partir del tercer día del procedimiento quirúrgico lavar todo el cuerpo, excluyendo la zona de cirugía, siguiéndolas normas mencionadas.

SOBREDOSIS: Proceder al lavado gástrico, usando medidas de sostén adecuadas. En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Tfno. 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS: Rara vez reacciones irritativas cutáneas y alérgicas generalizadas a Clorhexidina.

CONSERVACIÓN: Protéjase de la luz.

PRESENTACIONES:

ENVASE	CODIGO NACIONAL	UNIDAD DE EMBALAJE
500 ml	768853	Caja de 12 uds.

TITULAR: SSL Internacional

FABRICANTE: SSL Internacional

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: MAB Dental, S.AU. N° de laboratorio. 3285