

® COLIRCUSÍ HUMECTANTE

Colirio

COMPOSICIÓN.- Cada ml contiene 5,5 mg de cloruro sódico y 3 mg de hipromelosa. Excipientes: cloruro de benzalconio, edetato disódico, fosfato disódico, fosfato monosódico y agua purificada.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE.- Solución oftálmica, envase con 15 ml.

ACTIVIDAD.- Es una solución de baja viscosidad que alivia los estados de sequedad ocular, eliminando las molestias que produce la falta de humectación por su acción lubricante y protectora de la córnea.

LABORATORIO TITULAR - FABRICANTE

ALCON CUSÍ, S.A.

c/ Camil Fabra, 58

08320 El Masnou - Barcelona

INDICACIONES.- Para el alivio temporal o prevención del escozor e irritación debidos a la sequedad ocular.

CONTRAINDICACIONES.- Pacientes con alergia conocida a cualquier componente de la fórmula.

PRECAUCIONES DE EMPLEO.- No son necesarias precauciones especiales de empleo.

INTERACCIONES.- No se han descrito.

ADVERTENCIAS.- No son necesarias advertencias especiales.

Advertencia sobre excipientes:

Este medicamento, por contener cloruro de benzalconio como excipiente puede decolorar las lentes de contacto blandas. Si utiliza lentes de contacto, deberá retirarlas antes de la aplicación del producto y esperar de 10 a 15 minutos antes de volver a colocarse las lentes.

POSOLOGÍA.- Puede utilizarse tantas veces como sea necesario. Se instilarán 1 ó 2 gotas en cada ojo.

El número de aplicaciones diarias y la duración del tratamiento podrá modificarse según criterio médico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN.- Con la cabeza inclinada hacia atrás, separar hacia abajo el párpado inferior y dejar caer las gotas en el saco conjuntival (espacio entre el ojo y el párpado), mientras se dirige la mirada hacia arriba. Cerrar los ojos suavemente y mantenerlos cerrados durante algunos segundos.

Antes de usar otras medicaciones oftálmicas, esperar como mínimo 5 minutos.

Recomendaciones para la utilización de colirios.- Por tratarse de un preparado estéril, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- Cada paciente utilizará su propio envase.
- La aplicación del colirio deberá realizarse con la máxima higiene: limpieza de manos y evitando en lo posible cualquier contacto del goteador con alguna superficie (incluido el ojo).
- Después de cada aplicación, cerrar bien el envase.
- Finalizado el uso establecido deberá desecharse el resto del preparado aunque no se haya consumido en su totalidad.
- Desechar al mes de abierto el envase.

SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO.- Debido a las características de este preparado no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso tópico de la especialidad. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS.- No se han descrito.
Si observa cualquier reacción adversa, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD.- No se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

CONSERVACIÓN.- No son necesarias condiciones especiales para su conservación.

TEXTO REVISADO.- Febrero 1999

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

ALCON CUSÍ, S.A.
c/ Camil Fabra, 58
08320 El Masnou - Barcelona