



Zincation plus

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contienen:

Brea de hulla 0,4 g

Cinc piritionato 1 g

Excipientes: laurilsulfato de sodio, polietilenglicol 1500, poliquaternium 10, dietanolamida de coco, dietanolamida láurica, alcohol láurico mirístico, monoestearato de etilenglicol, PEG-7 gliceril cocoato, diestearato de PEG-150, carboximetilcelulosa sódica, silicato aluminico-magnésico, cocoamidopropil betaína, hidrolizado de proteínas TEA-Coco, fragancia D-1095, ácido cítrico monohidrato y agua purificada.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Champú. Frascos con 125 ml, 200 ml, 300 ml y 500 ml.

ACTIVIDAD

Zincation plus contiene como ingredientes activos breas de hulla o coaltar y cinc piritionato, que ayudan a disminuir la descamación excesiva del cuero cabelludo.

TITULAR Y FABRICANTE

Titular: Laboratorios ISDIN, S.A. Provençals, 33 08019 Barcelona

Fabricante: Laboratorio Farmacéutico Antonio Puig, S.A. C/ Potosi, 21. 08030 Barcelona

INDICACIONES

Zincation plus está indicado para el alivio local sintomático de las alteraciones capilares descamativas, tales como: dermatitis seborreica, psoriasisiforme, caspa y picor del cuero cabelludo.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la especialidad.

No aplicar en niños menores de 3 años.

No utilizar en caso de inflamación, heridas o infección del cuero cabelludo.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto con los ojos y mucosas. Zincation plus es sólo para uso externo sobre el cabello.

En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

INTERACCIONES

Su uso simultáneo con otros medicamentos puede producir efectos fotosensibilizantes aditivos; no se recomienda su uso simultáneo con metoxaleno o trioxaleno sistémicos o tópicos, ni con otros medicamentos o cosméticos sin consultar al médico o farmacéutico.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia: No se ha establecido la seguridad de uso de Zincation plus en el embarazo y/o lactancia, consultar al médico en estos casos.

Efectos sobre la capacidad de conducción: No se han descrito.

Uso en niños: no aplicar a menores de 3 años.

POSOLOGÍA

Aplicación sobre cuero cabelludo.

Debe utilizarse una o dos veces por semana.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PREPARADO

Humedecer bien los cabellos y aplicar Zincation plus en cantidad suficiente para producir espuma abundante. Aplicar un suave masaje con la yema de los dedos sobre el cuero cabelludo. Aclarar bien con agua. Repetir la aplicación y dejar actuar unos minutos, aclarar muy bien de nuevo.

SOBREDOSIS

En caso de ingestión podría causar náuseas y vómitos. Acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91.562.04.20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

Podría ocasionalmente causar irritación, erupción y raramente fotosensibilidad (sensibilidad a la luz solar) en la piel. Si apareciera alguno de estos síntomas, interrumpir el tratamiento y consultar con su médico. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO: Febrero 1999