

# Miozets

Comprimidos-Vía oral

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Tetraciclina (D.C.I.) .....	1 mg
Benzocaína (D.C.I.) .....	2 mg
Excipientes:	
Sacarosa .....	0,9 g
Mentol, esencia de menta, polivinilpirrolidona, estearato de magnesio, c.s.p.....	1 comp.

## PRESENTACIÓN:

Envase con 20 comprimidos

## PROPIEDADES:

MIOZETS por la acción antibacteriana tópica de la Tetraciclina y la acción anestésica local de la Benzocaína, tiene una acción antiséptica y analgésica en procesos infecciosos de boca y faringe, mejorando su sintomatología.

## TITULAR:

Urtsch-Aquiles OTC, S.L. Av. Camí Reial, 51-57  
08184 Palau-solità i Plagmans (Barcelona)

## INDICACIONES:

Alivio local sintomático de las pequeñas afecciones de boca y garganta, amigdalas, ronqueras, irritación de la garganta.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

## PRECAUCIONES:

Si los síntomas persisten más de dos días, se agravan, o van acompañados de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consulte a su médico.

## INTERACCIONES:

No utilizar conjuntamente con sulfamidas ni con inhibidores de la coagulasa. Evitar la utilización simultánea con otros antisépticos bucofaríngeos.

## ADVERTENCIAS ESPECIALES:

No administrar a niños menores de 6 años sin consultar con el médico.

**IMPORTANTE PARA LA MUJER:**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Este medicamento contiene 0,9 g de sacarosa por comprimido, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

**POSOLOGÍA:**

Adultos y niños mayores de 6 años: un comprimido cada 3 ó 4 horas. No tomar más de 7 comprimidos al día.

**NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

Dejar caer los comprimidos lentamente en la boca.

**SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:**

En caso de sobredosificación o de ingestión masiva accidental, pueden aparecer cólicos y diarreas, somnolencia o desmayo. En tal circunstancia, proceder a tratamiento sintomático. Acudir a un Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida.

**REACCIONES ADVERSAS:**

En raras ocasiones pueden producirse reacciones alérgicas. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

\*\*\*

Esta medicación no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Última revisión del prospecto: Julio 1997

**SIN RECETA MÉDICA**

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**