

NATUSAN Pomada

Composición

Complejo glicerobórico, conteniendo:

- Acido bórico	2.85g
- Tetraborato de sodio	0.15g
Parafina, lanolina, polietileno, dióxido de titanio y esencia de Ivoretta	c.s.p. 100g

Forma farmacéutica y contenido del envase

Natusan se presenta en forma de pomada, en tubos de 50g.

Actividad

Natusan contiene una combinación de ácido bórico y tetraborato de sodio en glicerina incorporada a una base de pomada, con propiedades antisépticas, para prevenir irritaciones cuando la piel está sometida a agresiones por causa de las excreciones del cuerpo y rozamientos por pañales.

Titular

Johnson & Johnson, S.A.
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7

Fabricante

Abelló Farmacia, S.L.
Subsidiaria de **Johnson & Johnson/MSD**
Campo de las Naciones (Madrid)
Antigua Ctra. N. II, Km. 32,800
28805 Alcalá de Henares(Madrid)

Indicaciones

Prevención de afecciones irritativas de la piel como escozaduras y rozaduras.

Contraindicaciones

Lesiones ulcerativas o infecciosas, hipersensibilidad a algunos de los componentes, heridas abiertas. No aplicar en ojos, oídos, nariz, boca y mucosa vaginal.

Precauciones

UTILIZAR UNICAMENTE SOBRE LA PIEL SANA

En caso de aparición de heridas o de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico. No aplicar sobre zonas muy amplias de la piel.

Interacciones medicamentosas u otro tipo de interacción

No se conocen.

Advertencias

- Embarazo y lactancia

Natusan no ejerce ninguna acción particular en estos estados.

- Uso de niños

Mantener la zona afectada limpia, cambiando frecuentemente los pañales.

- Uso en ancianos

Ninguna advertencia en particular.

- Efectos sobre la capacidad de conducción

Ninguno.

Posología y forma de empleo

Después de lavar y secar muy bien la zona afectada de la piel aplicar suavemente una capa fina de pomada. El efecto de **Natusan** hace innecesaria la aplicación masiva y frecuente. En caso de ser necesario puede aplicarse cada vez que se realice un cambio de pañal.

Sobredosificación

Usado en grandes cantidades, sobre piel lesionada o por ingestión accidental, pueden producirse dermatitis descamativa, náuseas, vómitos, diarreas, hipotensión y taquicardias. Acudir inmediatamente a un Centro médico indicando el producto y la cantidad ingerida.

También pueden consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono (91) 562 04 20.

Reacciones adversas

Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad o irritación cutánea, aunque no se han descrito para **Natusan**. Si se observa cualquier otra reacción adversa al medicamento no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Caducidad

Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Texto revisado: Junio 1998

**Los medicamentos deben mantenerse
fuera del alcance de los niños**