

PASTILLAS KOKI® DE MENTOL Y TIOTRICINA

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:

Tiotricina (D.C.I.)	0,50 mg
Benzocaína (D.C.I.)	2,00 mg
Mentol (D.C.I.)	2,00 mg
Sorbitol	612,90 mg
Otros Excipientes	c.s.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

20 comprimidos en envase blister.

ACTIVIDAD:

En las pastillas KOKI se asocia la acción antiséptica de la tirotricina con la acción anestésica local de la benzocaína que junto al mentol alivia las molestias ocasionadas por la irritación local de la garganta.

INDICACIONES:

Alivio local sintomático de las pequeñas afecciones bucofaringeas, como afonías, ronqueras, irritación de la garganta, y pequeñas úlceras bucales.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES:

No administrar a niños menores de 6 años, sin consultar al médico. Si los síntomas persisten más de dos días, se agravan o van acompañados de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No utilizar conjuntamente con sulfamidas ni con inhibidores de la colinesterasa. Evitar la utilización simultánea con otros antisépticos bucofaringeos.

ADVERTENCIAS:

Efectos sobre la capacidad de conducción: no se han descrito.

Embarazo y lactancia:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico del control del dopaje como positivo.

Este medicamento, contiene 612,9 mg de Sorbitol como excipiente por comprimido.

Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

POSOLÓGIA:

Para adultos y niños mayores de 6 años disolver lentamente un comprimido en la boca sin masticarlo ni tragarlo entero cada 3-4 horas, no tomar más de 7 comprimidos en 24 horas.

SOBREDOSIS:

La ingestión accidental de grandes dosis, puede producir: náuseas, vómitos, dolor abdominal, somnolencia o desmayo. Acudir a un Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida para efectuar el lavado gástrico y tratamiento sintomático.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al servicio de información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS:

Raramente reacciones alérgicas, en cuyo caso se aconseja suspender el tratamiento y consultar al médico. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

SIN RECETA MÉDICA

LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ
Glorieta Farmacéutico Pérez Giménez, 1
14007 - CÓRDOBA

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

