

# PULMOFASA

## JARABE BALSÁMICO

### COMPOSICIÓN:

#### Fórmula centesimal:

Benzoato sódico .....	3 g
Sulfoguayacolato potásico .....	1 g
Pantotenato cálcico .....	0'1 g
Canfocarbonato amónico .....	1 g
Eucaliptol .....	1 g
Extracto fluido de Polígala .....	1 g
Extracto fluido Bálsamo de Tolú .....	1 g
Extracto fluido de Savia Pino .....	2 g
Anetol .....	0'15 g
Nipagin .....	0'1 g
Sacarosa .....	50 g
Etanol .....	1 ml
Excipiente acuoso c.s.p. ....	100 ml

### FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Jarabe. El envase contiene 180 ml de jarabe.

### ACTIVIDAD

Pulmofasa es una asociación de componentes de acción predominantemente balsámica y antiséptica suave sobre el aparato respiratorio.

### TITULAR Y FABRICANTE

Laboratorio GENERFARMA, S. L.

Los Centelles, 7 Valencia 46006

### INDICACIONES

Procesos broncopulmonares en los que interesa una acción expectorante y balsámica (estados bronquíticos, gripes, resfriados, etc.).

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

### PRECAUCIONES

Este medicamento contiene por cucharadita (5 ml) 2'5 g de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos **diabéticos**.

Por contener **etanol** como excipiente, puede ser causa de riesgo en pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, en mujeres embarazadas y niños.

### INTERACCIONES

No se conocen.

## **ADVERTENCIAS**

**Embarazo y lactancia:** Por contener etanol como excipiente Pulmofasa puede ser causa de riesgo en embarazadas y mujeres lactantes. Como cualquier otro medicamento se tomará con precaución en los tres primeros meses de embarazo.

**Efecto sobre la capacidad de conducción:** Aun cuando contiene alcohol como excipiente la concentración del mismo no puede influenciar negativamente la conducción de vehículos.

**Empleo en diabéticos:** ver Precauciones y la siguiente advertencia.

Este medicamento contiene 90 g de **sacarosa**. Cada unidad de dosis recomendada (5 ml) contiene 2'5 g de sacarosa. No utilizar en pacientes con intolerancia a la fructosa, síndrome de malabsorción glucosa/galactosa, o deficiencia en la sacarasa-isomaltasa.

Este medicamento contiene 1% de **etanol**. Cada unidad de dosis (5 ml) contiene 0'05 g de etanol, lo que puede ser causa de riesgo en pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, enfermedad mental y en mujeres embarazadas y niños. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Pulmofasa jarabe puede irritar ligeramente la piel y las mucosas y aumentar el riesgo de ictericia en recién nacidos. También puede causar urticaria u otras reacciones como dermatitis de contacto. En raras ocasiones puede darse reacciones inmediatas como urticaria y broncoespasmo.

## **POSOLOGÍA**

**NIÑOS:** Una cucharadita de las de café (5 ml) cada 4-6 horas. Niños menores de 1 año según prescripción facultativa.

**ADULTOS:** Una cucharada (15 ml) cada 4-6 horas.

La duración del tratamiento será de unos pocos días y se corresponderá con el alivio de los síntomas. Si se prolonga la sintomatología deberá consultarse al médico.

## **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**

**AGITARSE ANTES DE USAR.**

Es conveniente hacer coincidir la administración con alguna comida.

## **SOBREDOSIS**

No se conoce ningún caso de intoxicación por la ingestión de Pulmofasa.

En caso de sobredosis o ingestión masiva accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

## **REACCIONES ADVERSAS**

Puede presentarse algún pequeño trastorno gastrointestinal (diarrea) de escasa importancia.

**“Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico”.**

## **CONSERVACIÓN**

Envases bien cerrados. Proteger del calor excesivo.

## **CADUCIDAD**

**“Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase”.**

## **PRESENTACIÓN**

Frasco con 180 ml de jarabe.

## **LOS MEDICAMENTOS DEBER MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**