

# SALVACOLON

Suspensión Estemporánea  
Vía oral

## REGENERADOR DE LA FLORA INTESTINAL

<b>FORMULA:</b>	Por 120 ml	Fórmula para 5 ml
B. subtilis .....	20 mg*	0,83 mg
Vitamina B <sub>1</sub> .....	48 mg	2 mg
Vitamina B <sub>2</sub> .....	12 mg	0,5 mg
Vitamina B <sub>6</sub> .....	120 mg	5 mg
Vitamina B <sub>12</sub> .....	144 mcg	6 mcg
Vitamina PP .....	480 mg	20 mg
Pantotenato de calcio (D.C.I.) .....	240 mg	10 mg
L-Lisina clorhidrato .....	7.200 mg	300 mg
Factor intrínseco .....	720 mg	30 mg
Excipientes: Sacarina sódica .....	59,8 mg	2,5 mg
Sacarosa .....	6.080 mg	253 mg
Aroma de naranja, Sílice coloidal		
* 2.000 millones de esporas		

### INDICACIONES

Diarreas, enteritis, enterocolitis, eubiótico intestinal, estreñimiento, anorexia, halitosis, aftas bucales. Se aconseja durante y después de los tratamientos con antibióticos y sulfamidas.

### CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

No se han descrito.

### ADVERTENCIAS

Este medicamento contiene 253 mg de sacarosa por cada 5 ml de suspensión, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

#### IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

### INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

### INTERACCIONES

Con ácido p-aminosalicílico, colchicina, neomicina.

### POSOLOGIA

En tratamientos prolongados, 10-30 ml de la suspensión efectuada dos veces al día, tomados entre comidas.

En los casos de tratamiento con antibióticos, el SALVACOLON debe tomarse dos horas antes o después de la correspondiente dosis de antibióticos.

En niños y lactantes dosis de 2 ml (1/2 cuchara de café) a 5 ml (1 cuchara de café) 2 veces al día.

**Sobredosificación:** No existe peligro de intoxicación por sobredosificación.

**Normas para la correcta preparación y administración:** Añadir agua potable hasta la señal de enrase. Tapar y agitar hasta conseguir la completa dispersión.

Verter el contenido del frasco así agitado en una cuchara de café; se recomienda desleirlo en agua azucarada o leche.

En los lactantes puede incorporarse a la leche del biberón, procurando que esté lo menos caliente posible.

**Tiempo de validez de la suspensión y conservación:** La validez de esta preparación una vez restituida la suspensión será de 15 a 20 días, siendo necesario mantenerla en el frigorífico.

### **REACCIONES ADVERSAS**

No se han descrito.

Deberá informar a su médico o farmacéutico de cualquier reacción adversa no descrita en el presente prospecto, que pudiera padecer durante el consumo de este medicamento.

### **PRESENTACION**

Frasco de 120 ml.

No consumir la especialidad después de la fecha indicada en el envase.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Sin receta médica**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños**

**Sin receta médica**

Director Técnico Farmacéutico: E.M.T. MUSSO

Laboratorios S.A.L.V.A.T., S.A.  
Gall, 30-36 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) ESPAÑA

9403