

SOBREPIN®

SOBREROL

Solución para aerosol

Sobrerol, único componente activo de SOBREPIN®, es una molécula original, obtenida mediante síntesis.

SOBREPIN® es un fármaco de acción mucolítica, caracterizado por una actividad directa sobre la mucosidad respiratoria, disminuyendo su viscosidad y facilitando su expulsión, eliminando así la mucoestasis. Esta acción directa sobre la mucosidad se justifica por los altos niveles de concentración de la sustancia en el pulmón y, asimismo, explica que el producto no reseque las vías respiratorias. SOBREPIN® acelera el efecto de los antibióticos, al favorecer el acceso de los mismos al foco infeccioso.

En resumen, SOBREPIN® actúa:

- Reduciendo la viscosidad de las secreciones bronquiales.
- Mejorando el nivel de ventilación pulmonar.
- Favoreciendo la reepitelización de la mucosa respiratoria.

Por consiguiente, SOBREPIN® reduce rápidamente la expectoración, disminuye la tos y la disnea y mejoran o desaparecen los signos obtenidos por la auscultación del tórax.

COMPOSICION

Una ampolla contiene: Sobrerol (D.C.I.) 40 mg.; Agua bidestilada, c.s.p. 3 ml.

INDICACIONES

Afecciones agudas y crónicas del aparato respiratorio con alteraciones de la secreción: rino-faringitis, laringotraqueítis, bronquitis aguda, gripe, bronconeumonías crónicas obstructivas, (bronquitis crónica, enfisema, asma).

POSOLOGIA

1 ampolla de solución en cada inhalación de aerosol o cateterismo tubárico aerosolizado. Una o dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

PRECAUCIONES

Sin precauciones especiales.

ADVERTENCIA

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

Debido al acusado tropismo pulmonar del Sobrerol y a su baja toxicidad, no se conocen los efectos de una intoxicación por este principio activo.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIONES

Aerosol: Envase con 10 ampollas de 3 ml.

Cápsulas: Envase con 24 cáps.

Jarabe: Frasco con 150 cc y medida dosificadora a 2,5, 5 y 10 cc.

Supositorios Adultos: Envase con 10 supositorios.

Supositorios Infantil: Envase con 10 supositorios.

Supositorios Lactantes: Envase con 10 supositorios.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

SIN RECETA MEDICA



TEDEC-MEIJU FARMA, S.A.

Carretera M-300, Km 30,500. 28802 Alcalá de Henares, Madrid.

Si está usted embarazada o cree que podría estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el feto y debe ser evitado por su médico.