

Solución
SCHOUM

COMPOSICIÓN

Cada cucharada de 15 ml contiene: Extractos fluidos de: Melissa Officinalis (Melisa) 75 mg, Rheum Officinalis (Ruibarbo) 18 mg, Fumaria Officinalis (Fumaria) 15 mg, Peumus Boldus (Boldo) 7,5 mg, Hamamelis Virginiana (Hamamelis) 4,5 mg, Hydrastis Canadensis (Hidrastis) 3 mg, Pyscidia Erythina (Piscidia) 3 mg, Esencia de Mentha Piperita (Menta) 6 mg.

EXCIPIENTES: Acetato de amilo, Bicarbonato Sódico, Bicarbonato Potásico, Carbonato de Litio, Sulfato Sódico, Cloruro Sódico, Cloruro Magnésico, Cloruro Cálcico, Glicerol (E-422) 900 mg, Tartracina (E-102) 0,3 mg, Etanol 30 mg, p-hidroxibenzoato de propilo y Sorbato potásico. Agua destilada csp 15 ml

INDICACIONES: Alivio sintomático de los trastornos digestivos de origen hepático tales como digestiones lentas o pesadas y estreñimiento.

POSOLOGÍA: Adultos: de 1 a 3 cucharadas soperas (15 ml cada una) antes de las comidas. Si persisten las molestias pasados 7 días, consultar a su médico.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo y lactancia.

No se debe tomar en presencia de procesos diarreicos de cualquier procedencia, dolores de estómago de origen desconocido, apendicitis o sus síntomas (nauseas, vómitos, calambres) y oclusión intestinal.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Al tomar grandes dosis, pueden aparecer dolores cólicos y pérdida de electrolitos por el uso prolongado.

PRECAUCIONES: Si las molestias persisten más de 7 días o se agravan, consultar al médico.

No sobrepasar la dosis indicada en la posología.

ADVERTENCIAS: Los pacientes hipertensos deben consultar al médico antes de usarlo.

EMBARAZO Y LACTANCIA: No utilizar en estos casos (ver contraindicaciones)

USO EN NIÑOS: No utilizar en menores de 12 años sin consultar al médico.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: No se han descrito.

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES: Este medicamento contiene 0,2% de Etanol en volumen final. Cada 15 ml o cucharada sopera, contiene 0,030 g de Etanol lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales.

Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos.

Este medicamento por contener Glicerol (E-422) como excipiente, puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Este medicamento contiene Tartracina (E-102) como excipiente puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

INTERACCIONES: Si está en tratamiento con algún medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO: En caso de ingestión accidental de grandes cantidades de medicamento, acudir a un centro médico o llamara al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

PRESENTACIÓN: Frasco con 500 ml.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: Las habituales.
Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
Revisado y aprobado con fecha: Febrero de 1999

210386/04



C/Adaptación,33 – Pol. Ind. “Los Olivos” – 28906 GETAFE (Madrid)