

**SORBENOR®**  
**Aspartato de Arginina**

**COMPOSICIÓN**

Cada ampolla bebible de 5 ml contiene:

Aspartato de arginina .... 1 g

Excipientes:

Sacarosa..... 1 g

Nipagín, nipasol, esencia de albaricoque y agua desionizada c.s.p ... 5 ml

**FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**

Estuche conteniendo 20 ampollas de 5 ml de solución bebible.

**ACTIVIDAD**

El principio activo de la especialidad **SORBENOR®**, aspartato de arginina, contribuye a la biosíntesis de proteínas.

**TITULAR**

Laboratorios CASEN-FLEET, S.L.  
Utebo (ZARAGOZA)

**FABRICANTE**

VIATRIS Manufacturing  
Burdeos (FRANCIA)

**INDICACIONES**

Tratamiento sintomático de los estados de cansancio, fatiga y convalecencia debidos a un insuficiente aporte de proteínas.

**CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave.

**PRECAUCIONES**

Por su contenido en arginina, las personas con retención urinaria sólo lo tomarán bajo vigilancia médica.

**INTERACCIONES**

No se han descrito.

**ADVERTENCIAS**

Este medicamento contiene 1 g de sacarosa por ampolla, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

**Embarazo**

**IMPORTANTE**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Lactancia**

No hay estudios sobre si el medicamento se excreta por la leche materna. En período de lactancia no deberá tomarse el producto sin consultar al médico.

### **Efectos sobre la capacidad de conducción**

No se han descrito.

### **Uso en niños**

Consultar al médico.

### **POSOLOGIA**

#### **Adultos**

2 a 4 ampollas bebidas, al día, en tratamientos mantenidos durante varias semanas, salvo prescripción facultativa.

#### **Niños**

La dosis debe ser establecida por el médico según la indicación, edad y el peso del niño. Como norma general, de una a dos ampollas diarias bebidas antes de las comidas.

### **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**

No es necesario el empleo de sierra, ya que son ampollas auto-rompibles, cuyas puntas se rompen fácilmente al hacer una pequeña tracción.

Coger la ampolla por su cuerpo y con la otra mano abrir una de las puntas. Dar la vuelta a la ampolla, poniéndola sobre el vaso donde se va a tomar y abrir entonces la otra punta. El vaciado se producirá por sí solo al mantener la ampolla en posición vertical.

### **SOBREDOSIS**

Ante posibles signos de intoxicación por sobredosis o ingestión masiva se hará, si procede, lavado gástrico y tratamiento sintomático.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

### **REACCIONES ADVERSAS**

En algunos casos, reacciones alérgicas. Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa atribuible a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

### **CONSERVACIÓN**

Condiciones normales. Temperatura ambiente.

### **CADUCIDAD**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### **LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**TEXTO REVISADO: JUNIO 2002**

**SIN RECETA MEDICA**

LABORATORIOS CASEN-FLEET, S.L.

UTEBO (Zaragoza)