

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Ambroxol Apotex 15 mg/5ml jarabe EFG

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es Ambroxol Apotex 15 mg/5 ml jarabe y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Ambroxol Apotex 15 mg/5 ml jarabe
3. Cómo tomar Ambroxol Apotex 15 mg/5 ml jarabe
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Ambroxol Apotex 15 mg/5 ml jarabe

El principio activo es clorhidrato de ambroxol.

Cada 5 ml de jarabe contienen 15 mg de ambroxol.

Los demás componentes son: aroma de frambuesa, ácido cítrico monohidrato, glicerol, hidroxietilcelulosa, ácido benzoico, propilenglicol, sorbitol al 70%, sacarina sódica y agua purificada.

Titular:

Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Países Bajos

Fabricante:

Laboratorios CINFA, S.A.
C/ Olaz-Chipi 10, Polígono Industrial Areta
31620 Huarte – Pamplona (Navarra)
España

Representante local:

Apotex España, S.L.
C/ Caléndula 93, Miniparc III, Edificio G, 2ª Planta
28109 El Soto de la Moraleja, Alcobendas, Madrid

1. QUÉ ES AMBROXOL APOTEX 15 mg/5 ml JARABE Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Ambroxol Apotex se presenta en envases que contienen 200 ml.

Ambroxol pertenece al grupo de medicamentos denominados mucolíticos. Actúa disminuyendo la viscosidad de las secreciones bronquiales y facilitando la expectoración.

El ambroxol está indicado en las afecciones agudas y crónicas de las vías respiratorias en las que sea necesario favorecer la eliminación de secreciones.

2. ANTES DE TOMAR AMBROXOL APOTEX 15 mg/5 ml JARABE

No tome Ambroxol Apotex 15 mg/5 ml jarabe

- Si ha experimentado fenómenos de alergia a ambroxol o a cualquiera de sus excipientes.
- Este medicamento no debe utilizarse en niños menores de 2 años.

Tenga especial cuidado con Ambroxol Apotex 15 mg/5 ml jarabe

Este medicamento contiene 2,25 g de sorbitol como excipiente por 5 ml. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa. Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Embarazo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. El tratamiento con ambroxol no ha demostrado ser nocivo durante el embarazo. No obstante, su médico valorará el beneficio/riesgo de su administración.

Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. El tratamiento con ambroxol no ha demostrado ser nocivo para el niño. No obstante, su médico valorará el beneficio/riesgo de su administración.

Toma de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO TOMAR AMBROXOL APOTEX 15 mg/5 ml JARABE

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Si estima que la acción de este medicamento es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Su médico le indicará la dosis apropiada y la duración del tratamiento.

La dosis habitual es:

Adultos: 1 medida de 10 ml, 3 veces al día.

Niños mayores de 5 años: 1 medida de 5 ml, 2-3 veces al día.

Niños de 2 a 5 años: 1 medida de 2,5 ml, 3 veces al día.

Si Usted ha tomado más Ambroxol Apotex 15 mg/5 ml jarabe del que debiera:

Consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Lleve este prospecto con usted. No se han descrito hasta la fecha síntomas de sobredosificación. El tratamiento en este caso será sintomático.

En caso de sobredosis o administración accidental, consultar con el Servicio de Información Toxicológica 91 562 04 20.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Ambroxol Apotex 15 mg/5 ml jarabe puede tener efectos adversos.

En algunos casos se han producido trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, acidez y molestias gastrointestinales. Raras veces se han producido reacciones alérgicas. Si se observa alguna de estas reacciones o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE AMBROXOL APOTEX 15 mg/5 ml JARABE

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

Caducidad

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en septiembre de 2002.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.
--

SIN RECETA MÉDICA

Este prospecto ha sido autorizado en febrero/2012.