

8366019-E-F.P. X

Iodina

40 ml

POVIDONA
IODADA 10%



COMPOSICIÓN POR 100 ml:
 Povidona (D.O.I.) Iodada 10 g
 EXPERTERSES: Lamin sulfato sodico 0,05 g; agua purificada c.s.p. 100 ml
 -soluto disuelto dehidratado a.s.p. pH 5-5,5

INDICACIONES: Desinfección de la piel y heridas superficiales.
 POSOLOGIA: Aplicar directamente sobre la piel y la zona a tratar.
 PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos.
 CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al yodo o medicamentos yodados.
 EFECTOS SECUNDARIOS: En los niños puede producirse a veces un aumento de la salivación y un aumento de la actividad de la tiroides.
 INTERACCIONES Y SU TRATAMIENTO: En casos de ingestión accidental, acudir a un centro médico y/o llamar al Servicio Nacional de Toxicología, tel. 91 562 24 20, indicando el producto y la cantidad ingerida. 40 ml
 CONTENIDO: 40 ml
 NO INGERIR. USO EXTENSO MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LAB. REIG JORRE, S.A. LAB. PARK ORGANY, S.L.
 Avda. Gran Capata, 10 Avda. Gran Capata, 10
 08970 Sant Joan Despi (Barcelona) 08970 Sant Joan Despi (Barcelona)

DD4144-08
 SIN RECETA MÉDICA

F.V.P.: 3,06 €
 F.V.P. IVA: 3,20 €



C.N. 8366019-E-F.P.

8 470008 366019