

TROFALGON

CAPSULAS

Los dos principios activos; cianocobalamina y lisozima, que contiene TROFALGON, son componentes naturales del organismo humano, desprovisto, en absoluto, de toxicidad.

La cianocobalamina (vitamina B12) ejerce un marcado efecto anabólico, promoviendo la síntesis de proteínas, con lo que se consigue un máximo aprovechamiento del aporte protéico indispensable para la edificación y reparación tisular.

La lisozima es una enzima de la leche de mujer, de la que carece la leche de vaca (lo mismo que los preparados para la lactancia artificial), que mejora la asimilación de los alimentos, normaliza la flora intestinal y aumenta las defensas del organismo contra infecciones. El deficiente desarrollo de algunos niños, especialmente los prematuros y los alimentados con la lactancia artificial, caracterizado por la falta de apetito, peso inferior al normal, debilidad general, trastornos digestivos, propensión a enfermedades, etc., se debe la mayoría de las veces a una mala asimilación de los alimentos, a un precario anabolismo protéico (indispensable para el desarrollo de los tejidos), a una disminución de las defensas naturales del organismo contra las infecciones y un desequilibrio en la flora intestinal con predominio de formas bacterianas anormales. También en los niños mayores y en los adultos se puede presentar un cuadro semejante durante o después del tratamiento de enfermedades infecciosas o en el período de convalecencia de intervenciones quirúrgicas.

Frente a estas alteraciones TROFALGON:

- Estimula el apetito de los anoréxicos.
- Mejora el peso de niños y adultos.
- Promueve el crecimiento de los niños.
- Refuerza las defensas inmunitarias del organismo.
- Reduce el período de convalecencia después de enfermedades e intervenciones quirúrgicas.
- Normaliza la flora intestinal.
- Facilita la digestión de la leche de vaca.

COMPOSICION POR CAPSULA:

Principios Activos:

Cianocobalamina (D. C. I.) 1 mg
Lisozima CIH 40 mg

Excipientes:

Celulosa microcristalina, gelatina, dióxido de titanio, óxido férrico (E-172) y eritrosina (E-127).

INDICACIONES.- La administración de TROFALGON está indicada, en niños prematuros, lactantes criados con lactancia artificial y en todos los niños que presenten trastornos de crecimiento, desnutrición, falta de apetito o alteraciones digestivas.

Lo mismo en adultos que en niños durante períodos de convalecencia de enfermedades e intervenciones quirúrgicas. Como coadyuvante en el tratamiento y profilaxis de enfermedades infecciosas, tanto bacterianas como víricas (especialmente sarampión, viruela, gripe y hepatitis). Como hepatoprotector en las agresiones del hígado de cualquier etiología.

POSOLOGIA Y ADMINISTRACION.- Vía oral.

Lactantes: 1 cápsula diaria. Abrir la cápsula, verter su contenido en el biberón o papilla y agitar hasta que se disuelva. (El color rojo que aparece al disolver el producto se debe a la cianocobalamina).

Niños mayores de un año: 1-2 cápsulas diarias, vaciando su contenido sobre un poco de agua o leche. Si la edad del paciente lo permite puede ingerir la cápsula sin abrirla.

Adultos: 2-4 cápsulas diarias, tomadas con un poco de agua o leche.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES.- No se han descrito.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si usted está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

INTERACCIONES.- No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS.- No se han descrito.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO.- No se han descrito casos de intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Telf. 91 562 04 20.

ADVERTENCIA.- Debido a que la Cianocobalamina es muy sensible a la luz, aconsejamos mantener la cápsula dentro del envase hasta el momento de usarla. Cuando se trate de lactantes o niños pequeños, añadir su contenido a la papilla, biberón o líquido en el instante que vaya a tomarlo.

PRESENTACION.- Blister con 20 cápsulas.

“No sobrepasar la fecha de caducidad que figura en el envase”

“Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños”



LABORATORIOS MADARIAGA S.L.

Electrónica, 7 - Polígono URTINSA II - 28923 ALCORCON (Madrid)

Fabricado por FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L. - Ctra. de Irún, km. 26,200
28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)