

VASOCONSTRICTOR PENSA
Nafazolina

COMPOSICION

Cada ml contiene:

Nafazolina clorhidrato 0,5 mg

Excipientes: ácido bórico, metilparabeno, esencia de nerolí, hidróxido sódico y agua purificada, c.s.p.

INDICACIONES

Rinología: Obstrucción y congestión nasal de origen inflamatorio, alérgico y traumático. Rinitis vasomotoras. Sinusitis. En general los procesos en que se desea realizar la descongestión de las mucosas por vasoconstricción.

Siempre que se prevean cambios importantes de presión atmosférica (viajes en avión, alpinismo, deportes subacuáticos).

POSOLOGIA

Rinología: dos gotas o nebulizaciones en cada fosa nasal, varias veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Evítese su empleo en pacientes con rinitis atrófica

INTERACCIONES

No se han descrito

EFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito

REACCIONES ADVERSAS

No deberán aplicarse por vía tópica sobre piel erosionada o heridas.

ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES

Por contener ácido bórico como excipiente está contraindicado en niños menores de 3 años.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No es posible por su empleo tópico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20

PRESENTACION

Vasoconstrictor 35 ml (nebulizador)

Vasoconstrictor 70 ml (recambio)

El frasco recambio de 70 ml está destinado para rellenar 2 veces (hasta la mitad) el frasco nebulizador de 35 ml.

Sin receta médica

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños

PENSA PHARMA, S.A

Paseo de la Alameda, 35 –planta 5ª

46023 Valencia

Fabricado por: Lab. Dr. Esteve, S.A. (Martorelles- Barcelona)