



COMPOSICIÓN POR: 100 g.

Alcanfor 5,00g

Esencia Trementina 5,00 g

Mentol 2,75 g

Esencia de Eucalipto 1,50 g

Timol 0,25 g

Excipientes: Esencia de cedro, Vaselina
(c.s.p. 100g)

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

POMADA. Envase de 50g.

ACTIVIDAD

La inhalación de sustancias aromáticas proporciona una moderada sensación de frío en la mucosa nasal, que se traduce en un alivio de la congestión nasal y la tos.

TITULAR

LABORATORIOS VICKS, S.L.

Avda. Bruselas, 24

28108 Alcobendas (Madrid)

FABRICANTE

PROCTER & GAMBLE

MANUFACTURING GMBH

Procter & Gamble Strasse, 1

D-64521 Gross-Gerau

Alemania

INDICACIONES:

Alivio sintomático de la tos y la congestión nasal existente en el resfriado común y la gripe.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. No administrar a niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

Uso externo únicamente. No superar la dosis recomendada. No ingerir, colocar en los orificios nasales ni aplicar sobre mucosas, quemaduras, piel lesionada o en la cara. No utilizar más de 7 días seguidos ni en áreas extensas de la piel.

Si los síntomas empeoran o persisten más de una semana o si se acompañan de fiebre alta, erupciones en la piel o dolor de cabeza persistente, consulte a su médico.

Usar con precaución en niños de 3 a 7 años, especialmente cuando haya factores como antecedentes de espasmo de laringe, convulsiones febriles o epilepsia.

No utilizar en vaporizadores fríos o humidificadores.

INTERACCIONES: No se han descrito.





ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia

Las mujeres en periodo de lactancia no deben utilizar este medicamento sin consultar al médico.

Importante para la mujer: Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Uso en niños: No usar en niños menores de 3 años y ver precauciones de empleo en niños de 3 a 7 años.

Efectos sobre la capacidad de conducción: No se han descrito.

No administrar a personas con asma, enfisema o cuando la tos va acompañada de abundantes secreciones, salvo indicación médica. La tos causada por el tabaquismo no debe ser tratada con este producto.

POSOLOGÍA E INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO:

Uso cutáneo: Adultos y niños mayores de 3 años: Extender una fina capa de pomada en el pecho, cuello y espalda. Al acostarse, cúbrase el pecho con un paño caliente, una vez extendida la capa de producto. Se puede repetir esta aplicación hasta 3 veces al día.

Para inhalaciones: Adultos y niños mayores de 6 años: Ponga una cucharada sopera en un tazón de agua caliente (no hirviendo) y aspire sus vapores durante 10-15 minutos. **Importante:** No calentar el producto junto con el agua ni recalentar el preparado. En ningún caso se debe utilizar microondas.

SOBREDOSIS:

No se han descrito casos de sobredosificación del medicamento.

En caso de ingestión accidental, acudir urgentemente a un centro médico indicando el medicamento y cantidad ingerida o consultar al Servicio de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS:

Rara vez se han presentado irritaciones o reacciones alérgicas en la zona de aplicación.

Si se observa estas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Si por confusión se toma por vía oral, se debe acudir urgentemente al Servicio de Urgencias.

CADUCIDAD: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

TEXTO REVISADO: Julio 1999.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

