

VITESTABLE

Grageas

COMPOSICIÓN: Cada gragea contiene

| | |
|---|-------|
| Principios activos: Panax Ginseng..... | 30 mg |
| α-Tocoferol (Vitamina E)..... | 10 mg |
| Jalea Real..... | 15 mg |

Excipientes: celulosa microcristalina, polietilenglicol, maltosa dextrosa, almidón glicolato sódico, talco, laurilsulfato sódico, dióxido de silicio coloidal, estearato magnésico, Eudragit E, sacarosa, gelatina, almidón de maíz, colorante E-173

PROPIEDADES:

Panax Ginseng. Según los autores japoneses (Sujhara, Sun, Asahina, Kotake, Yonchawe, etc.) los glucósidos de PANAX GINSENG fortalecen y estimulan las funciones del sistema nervioso central, especialmente en el caso de fatiga física y neuromuscular, en personas sobreexcitadas y agotadas por exceso de trabajo. Son, además simpaticomiméticos y afrodisíacos.

Según tratados alemanes (Medaux) el Ginseng está indicado en los estados de agotamiento nervioso, particularmente en la convalecencia, debilidad general, neurastenia, impotencia y cansancio, temblores y sensación de mareo en los ancianos. Rudolf lo prescribe en el caso de desarrollo deficiente del pecho femenino.

Jalea Real. Se sabe que la Jalea Real, segundo componente de VITESTABLE, posee la extraña propiedad de convertir las larvas de las abejas obreras en larvas de reinas. Las reinas son dos veces mayores y tienen una vida de 6 a 10 veces más larga que las obreras.

En el hombre, Bitum y Binat observaron que la aplicación de la Jalea real produce un aumento de los eosinófilos en sangre y una activación del metabolismo basal, generalmente bajo en las personas de edad avanzada. Marechal afirma que la Jalea Real equivale a un complejo vitamínico-hormonal natural, que estimula el tejido reticuloendotelial y regula el metabolismo celular.

Vitamina E. La Vitamina E, tercer componente de VITESTABLE, posee múltiples acciones sobre las glándulas sexuales, cuya función es estimulada.

INDICACIONES:

Síndrome climatérico masculino y femenino, frigidez sexual e impotencia.

Presenescencia

Trastornos vasculares y nerviosos

Involución senil

POSOLOGÍA:

Salvo mejor criterio facultativo, de 4 a 6 grageas diarias, tomadas de dos en dos a lo largo del día

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:

En pacientes aquejados de la enfermedad de Parkinson.

ADVERTENCIAS:

Importante para la mujer: Si está usted embarazada o cree que pueda estarlo, consulta a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Advertencias sobre excipientes: Este medicamento contiene 156 mg por g sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos. No t pacientes con intolerancia a la fructosa, síndrome de malabsorción de glucosa/ o deficiencia en la sacarasa-isomaltasa.

INCOMPATIBILIDADES:

No se conocen

REACCIONES ADVERSAS:

No se conocen

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: En caso de sobredosificación el paciente debe ser puesto en contacto con su médico o consultar al Se Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

CADUCIDAD: La fecha de caducidad viene impresa en el estuche y en la eti sobrepasar esta fecha.

TITULAR: Laboratorios ALCOR, S.L. Polígono Industrial del Henares, pe GUADALAJARA

PRESENTACIÓN: Envases con 20 grageas

SIN RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LC



laboratorios
alcor, s.l.