

**PROSPECTO**

## Prospecto: información para el usuario

### Supositorios de Glicerina Vilardell Niños Glicerol

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.

#### **Contenido del prospecto:**

- 1.- Qué es Supositorios de Glicerina Vilardell Niños y para qué se utiliza.
- 2.- Qué debe saber antes de empezar a usar Supositorios de Glicerina Vilardell Niños.
- 3.- Cómo usar Supositorios de Glicerina Vilardell Niños.
- 4.- Posibles efectos adversos.
- 5.- Conservación de Supositorios de Glicerina Vilardell Niños.
- 6.- Contenido del envase e información adicional.

#### **1. Qué es Supositorios de Glicerina Vilardell Niños y para qué se utiliza**

El glicerol, principio activo de este medicamento es un laxante que se administra por vía rectal. El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol de ablandar las heces que, junto a una ligera acción irritante local, consigue estimular los movimientos del intestino.

Está indicado para el alivio sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional para niños de 2 a 12 años.

#### **2. Qué debe saber antes de empezar a usar Supositorios de Glicerina Vilardell Niños**

##### **No use Supositorios de Glicerina Vilardell Niños:**

- Si es alérgico al glicerol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si padece alguna enfermedad anorectal, rectocolitis hemorrágica (un tipo de inflamación crónica del intestino) y hemorroides inflamadas.
- Si tiene retortijones, cólicos, náuseas, vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, otras enfermedades intestinales inflamatorias agudas o, en general, cualquier situación de dolor abdominal, sin conocer la causa que los produce.
- En niños menores de 2 años.

##### **Advertencias y precauciones:**

- En caso de la aparición de sangre en heces, irritación, dolor o que no mejore, debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.
- No use este medicamento más de 7 días seguidos, salvo que su médico se lo indique.
- Este medicamento se utilizará únicamente bajo estricto control médico en pacientes con enfermedades graves, especialmente cardiovasculares (relativas al corazón o a los vasos sanguíneos).

**Uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

**Embarazo y lactancia:**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

**Conducción y uso de máquinas:**

El uso de este medicamento no afecta a la capacidad para conducir y/o utilizar máquinas.

**3. Cómo usar Supositorios de Glicerina Vilardell Niños**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Niños de 2 a 12 años 1 supositorio al día, cuando sea necesario, o según prescripción del médico.

Forma de administración: El medicamento se administra por vía rectal.

Tras sacar el supositorio del envase, introdúzcalo profundamente en el recto. Reprima la evacuación lo máximo posible con el fin de que el medicamento pueda ejercer su acción.

Si en el momento de la administración nota resistencia, debe interrumpir la misma, ya que puede resultar perjudicial y dañina, y consulte con su médico.

No se debe utilizar el medicamento durante más de 7 días seguidos. Si los síntomas no mejoran debe suspender el tratamiento y consultar al médico.

**Si usa más Supositorios de Glicerina Vilardell Niños del que debiera:**

- No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación, debido a su uso.
- El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar a un síndrome de colon irritable (síntomas o molestias como alternancia del estreñimiento y de la diarrea, espasmos intestinales, hinchazón, náuseas y gases).
- En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 indicando el medicamento y la cantidad administrada.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Supositorios de Glicerina Vilardell Niños puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de glicerol por vía rectal como laxante, se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: picor, dolor e irritación del ano.


Si experimenta efectos adversos consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

**5. Conservación de Supositorios de Glicerina Vilardell Niños**

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medioambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Supositorios de Glicerina Vilardell Niños**

- El principio activo es el glicerol. Cada supositorio contiene 1.500 mg de glicerol.
- El otro componente (excipiente) es estearato de sodio.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Supositorios de Glicerina Vilardell Niños son supositorios translúcidos incoloros o con una ligera tonalidad amarilla, que vienen presentados en tarro con 12 y 18 supositorios y en blíster con 6 y 12 supositorios.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

Laboratorios Vilardell, S.A.  
Constitución, 66-68  
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Este prospecto ha sido aprobado en Abril 2012.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>