

## SALVARINA

### COMPOSICIÓN CUANTITATIVA por cápsula:

Ibuprofeno (D.C.I.) ..... 200 mg  
Cafeína anhidra..... 50 mg  
Dimenhidrinato (D.C.I.) ..... 15 mg  
Excipientes: Sílice coloidal. Monoestearato de glicerol. Glicolato sódico de almidón.  
Celulosa microcristalina. Estearato magnésico. Talco. Polividona. Colorantes cápsula:  
Eritrosina. Quinoleína. Dióxido de titanio. Indigotina.

### INDICACIONES

SALVARINA es un tratamiento sintomático para los dolores y molestias que preceden o acompañan a la menstruación.

### POSOLOGIA

Personas mayores de 12 años: 1 cápsula cada 4-6 horas mientras persistan los síntomas.

Si el dolor persiste se pueden usar tomas de 2 cápsulas.

No se tomarán más de 6 cápsulas al día.

Usar siempre la dosis menor que sea efectiva.

Tomar el medicamento con las comidas o con leche, principalmente si se notan molestias digestivas.

### PRECAUCIONES

No debe administrarse en pacientes que padezcan o hayan padecido asma.

No hay estudios sobre si se excreta por la leche materna. En período de lactancia no utilizar sin consultar al médico.

Las bebidas alcohólicas pueden aumentar la somnolencia producida por el dimenhidrinato, por lo que no se aconseja su utilización simultánea.

En caso de enfermedades cardíacas, hipertensión, glaucoma, diabetes, enfermedades obstructivas gastrointestinales e hipertrofia prostática, no tomar este medicamento sin consultar con el médico.

#### IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

### ADVERTENCIAS

Si el dolor se mantiene durante más de 10 días, se debe consultar al médico.

Si el dolor empeora o aparecen otros síntomas, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

### EFECTOS SECUNDARIOS

En alguna ocasión pudiera producir náuseas, dolores o ardor de estómago o erupción cutánea que desaparecen con la interrupción del tratamiento.

En caso de presentarse síntomas anormales (hemorragias, edemas o hinchazón) o no relacionados con la situación para la que se toma este medicamento, consultar con el médico antes de continuar el tratamiento.

En algunas personas podría aparecer somnolencia por acción del dimenhidrinato.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.

No debe administrarse a personas menores de 12 años.

Los pacientes con úlcera gástrica o con tratamiento médico de cualquier otra enfermedad de estómago, no deben utilizar este medicamento.

El ibuprofeno está contraindicado en pacientes que anteriormente al tomar antiinflamatorios o ácido acetilsalicílico hayan tenido síntomas de asma, rinitis o urticaria.

### **INTERACCIONES**

No se debe utilizar con otros analgésicos tales como paracetamol o ácido acetilsalicílico, ni con sedantes, tranquilizantes, hipnóticos y antihistamínicos, sin consultar al médico.

Los pacientes con tratamiento continuo con otros medicamentos deben consultar al médico antes de tomar este medicamento.

### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de sobredosificación accidental, se deberá solicitar consejo médico inmediatamente, indicándole el nombre y la cantidad del medicamento tomado.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

### **PRESENTACIÓN**

Envases con 12 y 24 cápsulas.

Sin receta médica.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños**