



ACEITE DE RICINO ORRAVAN

COMPOSICIÓN

Acete de Ricino

25 g

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Forma líquida Frasco 25 g.

ACTIVIDAD

Acción laxante y purgante

TITULAR Y FABRICANTE

LABORATORIO FARMACEUTICO ORRAVAN, S.L.
Avda. Gran Capità, 10
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

INDICACIONES

Necesidad de provocar el vaciado intestinal rápido (exploraciones radiológicas cirugía Intestinal intoxicaciones alimentarias)

CONTRAINDICACIONES

- Síntomatología de apendicitis (náuseas calambres, vómitos)
- Dolor abdominal no diagnosticado

PRECAUCIONES

Tratamientos prolongados pueden producir tolerancia a la acción laxante y dependencia de éste para conseguir la evacuación

INTERACCIONES

No se han descrito

ADVERTENCIAS

- Embarazo y lactancia: no se han descrito.
- Efectos sobre la capacidad de conducción: no se han descrito

POSOLOGÍA

Forma líquida. Vía oral.

Adultos: 1-3 cucharadas soperas (15 cc) en una sola toma al día.

Niños mayores de 2 años: 1-3 cucharaditas (5 cc) en una sola toma al día

Niños menores de 2 años: 1 a 5 cc en una sola toma al día

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Administrar con leche té zumo de frutas en ayunas

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis ó ingestión accidental, acudir a un centro médico y/o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91- 582 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida

REACCIONES ADVERSAS

Calambres abdominales.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consultar a su médico o farmacéutico

CONSERVACIÓN

En recipientes bien cerrados y protegidos de la luz.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

3816-01