



**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Usted.**  
*Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe Usted utilizar con cuidado **DILTIX gel** para obtener los mejores resultados.*

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días (5 días en niños), debe consultar a un médico.

**En este prospecto se explica:**

1. Qué es **DILTIX gel** y para qué se utiliza
2. Antes de usar **DILTIX gel**
3. Cómo usar **DILTIX gel**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **DILTIX gel**

**DILTIX gel**

**Composición**

- El principio activo es Ibuprofeno. Cada 100 gramos contienen 5 g de ibuprofeno.
- Los demás componentes (excipientes) son: dietilenglicol monoetil éter, macroglicéridos de caprilocaproilo, laurato de propilenglicol, hidroxipropilcelulosa, etanol 44,8 %v/v, mentol, agua purificada.

**Titular y fabricante**

**Titular:** **GERMED FARMACEUTICA S.L.**  
**Chile 8, 2º Oficina 203.Edificio Euromadrid**  
**Las Matas**

**Fabricante:** ARAFARMA GROUP, S.A.  
C/Fray Gabriel de San Antonio, s/n  
Pol. Ind. Marchamalo ESPAÑA

O

INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A.  
Laguna, 66-68-70. Poligono Industrial Urtinsa II (Alcorcón) - 28923 - España

**1. Qué es DILTIX gel y para qué se utiliza**

**DILTIX gel** es un gel brillante, translúcido, de olor característico, extensible, evanescente y lavable.

Se presenta en envases de 30 y 60 g para uso cutáneo.

El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que actúa aliviando el dolor.

**CORREO ELECTRÓNICO**

Sugerencias\_ft@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID



Este medicamento está indicado en el alivio local sintomático de los dolores ocasionales de tipo muscular y articular como los producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, esguinces leves producidos como consecuencia de torceduras y lumbago.

## 2. Antes de usar DILTIX gel

### No use DILTIX gel:

- si presenta hipersensibilidad (alergia) al ibuprofeno o a cualquier otro ingrediente de este medicamento (lea de nuevo la lista de ingredientes).
- Si ha tenido problemas asociados al ácido acetilsalicílico u otros analgésicos relacionados (incluyendo después de la administración oral), especialmente asma, rinitis alérgica (alergia nasal) o urticaria (alergia de la piel).
- si está embarazada o piensa que puede estarlo, o durante el periodo de lactancia.
- sobre heridas abiertas, mucosas o piel eczematosa.

### Tenga especial cuidado con DILTIX gel:

**DILTIX gel** es aplicado sobre la piel directamente en la zona dolorida, por lo que es poco probable que se produzcan los efectos adversos asociados a la administración oral de ibuprofeno u otros analgésicos similares. Sin embargo, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento:

- Si sufre de asma.
- Si tiene úlcera de estómago (también llamada úlcera gástrica o péptica).
- Si alguna vez ha tenido problemas renales.
- Si ya ha tomado aspirina u otros analgésicos.

### Embarazo:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

### Lactancia:

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

### Uso en niños:

*No administrar a niños menores de 12 años.*

### Información importante sobre algunos de componentes de DILTIX gel:

*Por contener etanol, como excipiente, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.*

### Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está usando, o ha usado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

## 3. Cómo usar DILTIX gel

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

**DILTIX gel** es de uso cutáneo exclusivamente externo (sobre la piel).

Para perforar el tubo, invierta el tapón y presione.



*Adultos y niños mayores de 12 años:* Aplicar una fina capa del preparado en la zona dolorida mediante un ligero masaje para facilitar la penetración de 3 a 4 veces al día.

Tras la aplicación de **DILTIX gel** se deben lavar las manos.

Si estima que la acción de **DILTIX gel** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

*Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días (5 días en los niños), debe consultar a un médico.*

**Si usted usa más DILTIX gel del que debiera:**

*Si Usted ha utilizado **DILTIX gel** más de lo que debe o ha ingerido accidentalmente el contenido del tubo, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 5620420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.*

**Si olvidó usar DILTIX gel:**

*No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente continúe con el tratamiento habitual tan pronto como sea posible.*

*No debe sobrepasarse la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.*

#### **4. Posibles Efectos Adversos**

Como todos los medicamentos, **DILTIX gel** puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente puede producirse enrojecimiento, inflamación de la piel (dermatitis), irritación local, picor en el punto de aplicación que desaparece al suspender el tratamiento.

Si observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

#### **5. Conservación de DILTIX gel**

*Mantenga **DILTIX gel** fuera del alcance y de la vista de los niños.*

*No se precisan condiciones especiales de conservación.*

**Caducidad:**

*Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase y en el tubo.*

Este prospecto ha sido aprobado en Julio 2002.



**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Usted.**  
*Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe Usted utilizar con cuidado **DILTIX gel** para obtener los mejores resultados.*

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días (5 días en niños), debe consultar a un médico.

**En este prospecto se explica:**

6. Qué es **DILTIX gel** y para qué se utiliza
7. Antes de usar **DILTIX gel**
8. Cómo usar **DILTIX gel**
9. Posibles efectos adversos
10. Conservación de **DILTIX gel**

**DILTIX gel**

**Composición**

- El principio activo es Ibuprofeno. Cada 100 gramos contienen 5 g de ibuprofeno.
- Los demás componentes (excipientes) son: dietilenglicol monoetil éter, macrogolglucéridos de caprilocaproílo, laurato de propilenglicol, hidroxipropilcelulosa, etanol 44,8 %v/v, mentol, agua purificada.

**Titular y fabricante**

**Titular:** **GERMED FARMACEUTICA S.L.**  
**Chile 8, 2º Oficina 203.Edificio Euromadrid**  
**Las Matas**

**Fabricante:** Laboratorios Iquinosa, S.A.  
C/ Alpedrete, 24  
MADRID

ARAFARMA GROUP, S.A.  
C/Fray Gabriel de San Antonio, s/n  
Pol. Ind. Marchamalo ESPAÑA

**6. Qué es DILTIX gel y para qué se utiliza**

**DILTIX gel** es un gel brillante, translúcido, de olor característico, extensible, evanescente y lavable.

Se presenta en envases de 30 y 60 g para uso cutáneo.

El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que actúa aliviando el dolor.

Este medicamento está indicado en el alivio local sintomático de los dolores ocasionales de tipo muscular y articular como los producidos por: pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, esguinces leves producidos como consecuencia de torceduras y lumbago.

## 7. Antes de usar DILTIX gel

### No use DILTIX gel:

- si presenta hipersensibilidad (alergia) al ibuprofeno o a cualquier otro ingrediente de este medicamento (lea de nuevo la lista de ingredientes).
- Si ha tenido problemas asociados al ácido acetilsalicílico u otros analgésicos relacionados (incluyendo después de la administración oral), especialmente asma, rinitis alérgica (alergia nasal) o urticaria (alergia de la piel).
- si está embarazada o piensa que puede estarlo, o durante el periodo de lactancia.
- sobre heridas abiertas, mucosas o piel eczematosa.

### Tenga especial cuidado con DILTIX gel:

**DILTIX gel** es aplicado sobre la piel directamente en la zona dolorida, por lo que es poco probable que se produzcan los efectos adversos asociados a la administración oral de ibuprofeno u otros analgésicos similares. Sin embargo, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento:

- Si sufre de asma.
- Si tiene úlcera de estómago (también llamada úlcera gástrica o péptica).
- Si alguna vez ha tenido problemas renales.
- Si ya ha tomado aspirina u otros analgésicos.

### Embarazo:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

### Lactancia:

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

### Uso en niños:

*No administrar a niños menores de 12 años.*

### Información importante sobre algunos de componentes de DILTIX gel:

*Por contener etanol, como excipiente, las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.*

### Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está usando, o ha usado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

## 8. Cómo usar DILTIX gel

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

**DILTIX gel** es de uso cutáneo exclusivamente externo (sobre la piel).

Para perforar el tubo, invierta el tapón y presione.



*Adultos y niños mayores de 12 años:* Aplicar una fina capa del preparado en la zona dolorida mediante un ligero masaje para facilitar la penetración de 3 a 4 veces al día.

Tras la aplicación de **DILTIX gel** se deben lavar las manos.

Si estima que la acción de **DILTIX gel** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

*Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días (5 días en los niños), debe consultar a un médico.*

**Si usted usa más DILTIX gel del que debiera:**

*Si Usted ha utilizado **DILTIX gel** más de lo que debe o ha ingerido accidentalmente el contenido del tubo, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 5620420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.*

**Si olvidó usar DILTIX gel:**

*No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente continúe con el tratamiento habitual tan pronto como sea posible.*

*No debe sobrepasarse la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.*

## **9. Posibles Efectos Adversos**

Como todos los medicamentos, **DILTIX gel** puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente puede producirse enrojecimiento, inflamación de la piel (dermatitis), irritación local, picor en el punto de aplicación que desaparece al suspender el tratamiento.

Si observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

## **10. Conservación de DILTIX gel**

*Mantenga **DILTIX gel** fuera del alcance y de la vista de los niños.*

*No se precisan condiciones especiales de conservación.*

**Caducidad:**

*Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase y en el tubo.*

Este prospecto ha sido aprobado en Julio 2002.