



CALMAPICA Amoniaco

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado CALMAPICA para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 1 día, debe consultar a un médico.

En este prospecto se explica:

1. Qué es CALMAPICA y para qué se utiliza.
2. Antes de usar CALMAPICA
3. Cómo usar CALMAPICA
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de CALMAPICA

CALMAPICA

Amoniaco

100 ml de emulsión contienen 17,5 ml de solución de amoniaco al 20% como principio activo. Los demás componentes (excipientes) son: monoestearato de glicerol, éter cetosteárico de macrogol 12, éter cetosteárico de macrogol 20, parafina líquida, propilenglicol y agua purificada.

TITULAR Y RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN

LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ

Pol. Ind. Los Mochos. Polígono 8 - Parcela 20. Crta. A-431, Km 19
(Almodovar del Río) - 14720 – España

1. QUÉ ES CALMAPICA Y PARA QUÉ SE UTILIZA

- Calmapica es una emulsión cutánea.
- Se presenta en un tubo con aplicador que contiene 15 ml de emulsión cutánea.
- Este medicamento es efectivo para aliviar el picor.
- Calmapica se emplea en el alivio local sintomático del picor producido por picaduras de insectos y ortigas.

2. ANTES DE USAR CALMAPICA

No utilice CALMAPICA en los siguientes casos:

- Alergia al amoníaco o a cualquiera de los componentes del medicamento.
- Niños menores de 2 años.

Tenga especial cuidado con Calmapica:

- Este medicamento es de uso externo . No ingerir.
- Evite el contacto con los ojos y mucosas (nariz, boca, etc.). En caso de contacto accidental, lavar con abundante agua.
- No aplicar un vendaje hasta que no se haya secado el líquido.
- Si después de la picadura siente debilidad, sudor, náuseas u otros síntomas, o bien se produce agravamiento, inflamación o persistencia de los sistemas tras el uso de este medicamento, interrumpa su utilización y acuda inmediatamente a un centro médico.

Embarazo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

Lactancia

Las mujeres en período de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

Uso en niños

No utilizar en niños menores de 2 años.

Conducción y uso de máquinas

No se han descrito efectos en este sentido.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica, homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.

3. CÓMO USAR CALMAPICA

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Si estima que la acción de Calmapica es demasiado fuerte o débil, comuníquelo a su médico o farmacéutico.

Uso cutáneo.

Agite CALMAPICA antes de usarlo. Aplique CALMAPICA sobre la zona en la que se ha producido la picadura, realizando un suave movimiento circular con el propio aplicador.

Repita la operación si es necesario una vez más.

Si los síntomas persisten más de 1 día, consultar al médico.

Si usted utiliza más CALMAPICA del que debiera:

Puede producirse irritación de la piel, así como estornudos, tos, lagrimeo, irritación e inflamación de los ojos por inhalación de sus vapores.

Si se produce una ingestión, no debe provocarse el vómito; deben ingerirse leche, zumos de cítricos o agua. Debe acudir inmediatamente a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, CALMAPICA puede tener efectos adversos.

Si se produce contacto con los ojos, mucosas (boca, nariz, etc) lavar rápidamente con abundante agua y consultar al médico.

Puede producirse irritación y quemaduras, especialmente tras la aplicación de un vendaje o por uso continuado. Si esto ocurre, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.

Si se observan éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE CALMAPICA

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

Mantener el tubo perfectamente cerrado.

Caducidad

No utilizar CALMAPICA después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en marzo de 2003