



**PROSPECTO : INFORMACIÓN PARA EL USUARIO**  
**supositorios de glicerina CUVE adultos**  
Glicerol

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

**Contenido del prospecto:**

1. Qué es SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos y para qué se utiliza
2. Antes de usar SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos
3. Cómo usar SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos
6. Información adicional

**1. QUÉ ES SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

El glicerol, principio activo de este medicamento es un laxante, que se administra por vía rectal. El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol de ablandar las heces que, junto a una ligera acción irritante local, consigue estimular los movimientos del intestino.

Está indicado para el alivio local sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional para adultos y adolescentes a partir de 12 años.

**2. ANTES DE USAR SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos**

**No use SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos:**

-Si es alérgico (hipersensible) al glicerol, o a cualquiera de los demás componentes (excipientes) del medicamento.

-Si padece alguna enfermedad anorectal, rectocolitis hemorrágica (un tipo de inflamación crónica del intestino) y hemorroides inflamadas.

Si tiene retortijones, cólicos, náuseas, vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, enfermedades intestinales inflamatorias agudas o, en general, cualquier situación de dolor abdominal, sin conocer la causa que los produce.

-En niños menores de 12 años.

**Tenga especial cuidado con SUPOSITARIOS DE GLICERINA CUVE adultos:**

En caso de la aparición de sangre en heces, irritación, dolor o que no mejora debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

No use este medicamento más de 7 días seguidos, salvo que su médico se lo indique.

Este medicamento se utilizará únicamente bajo estricto control médico, en pacientes con enfermedades graves, especialmente, cardiovasculares (relativas al corazón o a los vasos sanguíneos).

**Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos - incluso los adquiridos sin receta.

**Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

**Conducción y uso de máquinas**

El uso de este medicamento no afecta a la capacidad para conducir y/o utilizar máquinas.

**3. CÓMO USAR SUPOSITARIOS DE GLICERINA CUVE adultos**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas.

Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

La dosis normal es:

Adultos y adolescentes a partir de 12 años:

1 supositorio al día, cuando sea necesario, o según prescripción del médico.

**Uso en niños**

Este medicamento está contraindicado en niños menores de 12 años.

Forma de administración:

Abrir el frasco, y sacar el supositorio. Introducirlo en el ano profundamente, mantener los glúteos juntos durante un tiempo.

Reprima la evacuación lo máximo posible a fin de que el medicamento pueda hacer su acción.

Si en el momento de la administración nota resistencia, debe interrumpir la misma, ya que puede resultar perjudicial y dañina, y consulte con su médico.

No se debe utilizar el medicamento durante más de 7 días seguidos. Si los síntomas no mejoran debe suspender el tratamiento y consultar al médico.

**Si usa más SUPOSITARIOS DE GLICERINA CUVE adultos del que debiera**

No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación, debido a su uso.

El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar a un síndrome de colon irritable (síntomas o molestias como alternancia del estreñimiento y de la diarrea, espasmos intestinales, hinchazón, náuseas y gases).

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91.562.04.20 indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el periodo de utilización de SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos como laxante, observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud:

picor, dolor e irritación del ano.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos**

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conservar por debajo de 25 °C.

Mantener el frasco en el estuche para protegerlo de la luz.

##### **Caducidad:**

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

#### **6. INFORMACIÓN ADICIONAL**

##### **Composición de SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos**

Cada supositorio contiene 3 gramos de glicerol como principio activo.

Los demás componentes (excipientes) son: carbonato de sodio y ácido esteárico.

##### **Aspecto del producto y contenido del envase**



SUPOSITORIOS DE GLICERINA CUVE adultos son supositorios transparentes, incoloros ligeramente opacos, textura uniforme, de forma ovoidea que se presentan en envases de 4 y 12 supositorios.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ, S.A.  
Ctra. A-431 Km.19  
14720 Almodóvar del Río (Córdoba)

**Este prospecto ha sido aprobado en febrero 2011**