



PROSPECTO

PUNTUAL



Senósidos A + B sal cálcica

COMPOSICION

- **Senósidos A + B sal cálcica.....30 mg**
- **Glicerol c.s.p.....1 ml**

1 ml = 20 gotas

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Acción laxante.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático del estreñimiento ocasional.

POSOLOGIA Y MODO DE EMPLEO

Adultos: dosis mínima.....8 gotas/día/toma

dosis media.....16 gotas/día/toma

dosis máxima.....24 gotas/día/toma

Niños de 6 a 12 años:4 a 8 gotas/día/toma

Niños menores de 6 años consultar al médico.

Ingerir las gotas disolviéndolas en un poco de agua u otro líquido. Administrar preferentemente por la noche para conseguir el efecto deseado a la mañana siguiente.

CONTRAINDICACIONES

Abdomen agudo, apendicitis

Dolor abdominal de origen desconocido, obstrucción intestinal, trastornos del balance electrolítico.

Alergia a alguno de sus componentes.

INCOMPATIBILIDADES

Con glucósidos cardíacos. No debe tomarse al mismo tiempo que otros medicamentos, ya que puede alterar su absorción, distanciar su toma al menos 2 horas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Expulsión de gases precede a la evacuación normal. Ocasionalmente diarrea o dolor abdominal. Erupciones cutáneas.

PRECAUCIONES

No utilizar durante más de 6 días sin consultar al médico.

ADVERTENCIAS

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar al médico antes de tomar este medicamento.



Puede aparecer una coloración rojiza en la orina debido a la eliminación del principio activo.



Advertencias sobre excipientes:

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

En caso de ingestión accidental o intencionada de 5-10 ml, en 3-4 horas aparecen evacuaciones blandas, diarrea y, a veces, vómitos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, Tel: 91 5620420, indicando el producto y la cantidad ingerida.

PRESENTACIÓN

Frasco cuentagotas de 15 ml.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SIN RECETA MEDICA

LAINCO, S.A., Avda. Bizet, 8-12. 08191 RUBÍ (Barcelona).