

## ARCALION<sup>0</sup> 200 Sulbutiamina

### COMPOSICION

Principio Activo: Sulbutiamina (D.C.I.) 200 mg.

Excipientes: Almidón de maíz, Almidón de maíz desecado, Bicarbonato sódico, Carboximetilcelulosa, Cera blanca, Dióxido de titanio (E-171), Estearato de magnesio, Etilcelulosa, Glucosa, Amarillo Anaranjado S (E-110), Lactosa, Monooleato de glicerol, Polisorbato 80, Polividona, Sacarosa, Sílice coloidal y Talco en c.s.p. una gragea.

### INDICACIONES

Siempre que exista una insuficiencia de tiamina, en los siguientes casos:

#### En el adulto:

- Astenia
- Surmenage
- Apatía
- Estados depresivos
- Trastornos de la memoria
- Trastornos iatrógenos de la vigilia
- Disarmonía neurovegetativa de proyección somática
- Desorientación y desinserción ambiental
- Deficiencia intelectual

#### Indicaciones especializadas:

- Rehabilitación de enfermos coronarios
- Deshabituación de toxicómanos

#### En el niño:

- Inestabilidad
- Alteraciones de la atención y de la memoria
- Trastornos del comportamiento
- Psicastenia del niño normal.

### CONTRAINDICACIONES

Antecedente de hipersensibilidad.

### INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

### PRECAUCIONES

#### IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este

medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

### **ADVERTENCIAS**

*Advertencia sobre excipientes:* Este medicamento contiene 20 mg de glucosa por gragea, lo que debe ser tenido en cuenta por los pacientes diabéticos.

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Este medicamento por contener colorante Amarillo Anaranjado S puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Excitación, trastornos gástricos, trastornos del sueño, posibles cefaleas y reacciones cutáneas de hipersensibilidad.

### **INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO**

En caso de absorción masiva se puede observar una agitación con euforia y temblor de las extremidades. Estos trastornos son transitorios y desaparecen rápidamente sin secuelas.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562.04.20.

### **POSOLOGIA**

Como norma general la posología recomendada es de 2 grageas en el desayuno.

### **PRESENTACION**

Cajas de 30 grageas dosificadas a 200 mg de principio activo cada una de ellas.

SIN RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

Laboratorios Servier, S.A.  
Avenida de los Madroños 33  
28043 Madrid