

MediNait

Jarabe

LABORATORIOS VICK, S.L

Ayda, del Partenón, 16-18. Campo de las Naciones, 28042 Madrid

Fabricado por:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH,
H.S. Richardson- Str, D-64521 Gross Gerau, Alemania
Texto revisado: Julio 1996

Embarazo y lactancia: Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar a su médico.

Importante para la mujer: Si usted está embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica (Teléfono 91 562 04 20), indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

La intoxicación masiva debida al Paracetamol puede resultar en hepatotoxicidad, que no se manifiesta a veces hasta transcurrida más de una semana de la ingestión. Se recomienda estricta vigilancia clínica. Existe evidencia de que la administración de protectores hepáticos de tipo tiólico (cisteamina, acetilcisteína, etc.) puede minimizar el cuadro de hepatotoxicidad. A las dosis recomendadas e incluso muy superiores a las mismas, no se han observado efectos tóxicos.

COMPOSICIÓN POR:

	5 ml
Paracetamol	100 mg
Doxilamina, succinato	1,25 mg
Efedrina, sulfato	1,33 mg
Dextrometorfano, bromhidrato	2,5 mg

Excipientes (c.s.p. 5 ml): sacarosa (1,375 g), alcohol etílico (18%v/v), citrato sódico hidratado, ácido cítrico hidratado, benzoato sódico E 211, polietilenglicol 6000, glicerina E 422, anetol, colorantes amarillo quinolina E 104, carmín de índigo E 132, agua purificada.

Tómese a la hora de acostarse siguiendo las instrucciones de uso

Utilice el vaso dosificador.

Dosificación:

Adultos: Desde 12 años, 30 ml (nivel superior del vaso dosificador) a la hora de acostarse.

Niños: De 10 a 12 años, 15 ml (nivel inferior del vaso dosificador) a la hora de acostarse.

Este preparado no debe administrarse a niños menores de 10 años sin haber consultado a su médico.

Efectos secundarios: En casos raros puede producir somnolencia, vértigo y aumento de la sedación, pero nunca con características de gravedad. Si los síntomas persisten o si se está tomando otros preparados, consulte a su médico.

Contraindicaciones: Insuficiencia hepática o renal. Antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No debe emplearse en casos de hipertensión, cardiopatías graves, diabetes o enfermedad tiroidea a menos que sea controlado por un médico.

Alivio sintomático del dolor de cabeza, congestión nasal, estornudos, tos y malestar general presentes en el resfriado común y la gripe.

Especialmente indicado para combatir la tos durante la noche.
Advertencias: No exceder la dosis recomendada. Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control de dopaje como positivo. **Advertencias sobre excipientes:** Por contener benzoato sódico puede irritar ligeramente las mucosas. Contiene 18% de etanol en volumen final. Cada 5 ml contiene 0,7g de etanol. **PRECAUCIÓN** No debe administrarse a niños, embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, epilepsia, alcoholismo o daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. Puede disminuir la capacidad de reacción por lo que se aconseja precaución al conducir y manejar maquinaria peligrosa. Por contener glicerina puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. Contiene 1,375 g de sacarosa por cada 5 ml lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

Incompatibilidades: No se han descrito.

Jarabe 120 ml VIA ORAL

SIN RECETA MÉDICA

No conservar a temperatura superior a 25°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

