

CLIENTE: LABORATORIOS ALCALA FARMA

Fecha de la prueba:
16 - Febrero - 2006Modelo: Prospecto Inistolin Pediátrico Antitusivo AI/F
Tamaño: 140 X 170 mm
Colores (Pantones): Negro

PLEGADO: No

PRUEBA 1

ANVERSO

Inistolin **Pediátrico Antitusivo****COMPOSICIÓN**

Cada 5 ml contienen:

Pseudoefedrina (D.C.I.), clorhidrato 30 mg

Dextrometorfano (D.C.I.) bromhidrato 10 mg

Sacarosa, Sorbitol, Sacarina sódica, Benzoato sódico, Hidroxibenzoato de metilo, Aroma de fresa, Ponceau 4R (E-124) y agua purificada, c.s.

PROPIEDADES

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO contiene un descongestionante y un antitusígeno ambos de reconocida eficacia clínica. El Dextrometorfano es un antitusígeno seguro y eficaz. La Pseudoefedrina es un descongestionante de las mucosas del tracto respiratorio superior, especialmente de la mucosa y de los senos nasales.

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO suprime la tos improductiva y descongestiona las vías respiratorias.

INDICACIONES

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO, está indicado para el alivio temporal de la tos debida a irritaciones de la garganta, bronquios y faringe, tan común en los estados gripales y resfriados. También está indicado para el alivio de la congestión nasal debida al catarro común y sinusitis.

POSOLOGIA**Niños de 6 a 12 años:** 5 ml, 3 veces al día.**Niños de 2 a 5 años:** 2,5 ml, 3 veces al día.

Beber un vaso de agua después de cada dosis de medicación.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO está contraindicado en pacientes que hayan demostrado previamente hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Contraindicado en personas que hayan estado tratadas con antidepresivos tipo inhibidores de la monoaminooxidasa en las dos últimas semanas.

Los pacientes con hipertensión hipertiroidismo, diabetes, mellitus o trastornos cardíacos isquémicos, deben utilizar este medicamento únicamente por consejo médico.

Consulte a su médico si la tos persiste más de una semana, o si va acompañada de fiebre alta. Erupciones en la piel o dolor de cabeza persistente.

No administrar a niños menores de 2 años sin consultar al médico.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por el médico.

Este medicamento contiene 2,835 g de sacarosa por cada 5 ml, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

Este medicamento contiene 1 g de sorbitol como excipiente por cada 5 ml, puede causar molestias de estomago y diarrea, no debe de utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control como positivo.



PRUEBA CORREGIDA	ENTREGADO A OFICINA / VENTAS	DEVUELTO CON CAMBIOS	NUEVO ENVIO PRUEBAS	O.K. CLIENTE	CONTROL POSITIVOS
	16/2/2006				

CLIENTE: LABORATORIOS ALCALA FARMAFecha de la prueba:
16 - Febrero - 2006Modelo: Prospecto Inistolin Pediátrico Antitusivo AI/F
Tamaño: 140 X 170 mm
Colores (Pantones): Negro

PLEGADO: No

PRUEBA 1

REVERSO

Este medicamento contiene Ponceua 4R (E124) como excipiente, por lo que puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO debe ser utilizado con precaución en aquellos pacientes bajo tratamiento con supresores del apetito, estimulantes tipo anfetamina y agentes hipotensores. No se debe tomar en casos de tos crónica persistente, tal como la que se presenta en fumadores o asmáticos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No son frecuentes. En algunos pacientes la Pseudoefedrina puede causar ligero insomnio. Debido a la presencia de Dextrometorfano, en raras ocasiones puede aparecer somnolencia o molestias gastrointestinales.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

El medicamento es seguro si no se exceden en las dosis recomendadas.

Los síntomas de una intoxicación por este preparado consisten, en una ligera ansiedad, taquicardia y una ligera hipertensión debido a la presencia de Dextrometorfano, que desaparecen rápidamente provocando el vómito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91-562 04 20)

CONDICIONES DE CONSERVACION

Proteger de la luz.

PRESENTACION

INISTOLIN PEDIATRICO ANTITUSIVO

Envase de 120 y 200 ml.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

 **Consumer Healthcare**

Plaza Xavier Cugat, 2, Edificio D
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Fabricante:

Alcalá Farma, S.L.
Carretera M-300, Km. 29,920
Alcalá de Henares
Madrid

AI/F

PRUEBA CORREGIDA	ENTREGADO A OFICINA / VENTAS	DEVUELTO CON CAMBIOS	NUEVO ENVIO PRUEBAS	O.K. CLIENTE	CONTROL POSITIVOS
	16/2/2006				