

CLIENTE: LABORATORIOS ALCALA FARMAFecha de la prueba:
16 - Febrero - 2006Modelo: Prospecto Inistolin Pediátrico Expectorante EI/F
Tamaño: 140 X 170 mm
Colores (Pantones): Negro

PLEGADO: No

PRUEBA 1

ANVERSO**Inistolin** **Pediátrico Expectorante****COMPOSICION**

Cada 5 ml contienen:

Pseudoefedrina (D.C.I.), clorhidrato 30 mg

Guaifenesina (D.C.I.) 100 mg

Sacarosa, Glicerol (E-422), Sacarina sódica, Hidroxibenzoato de metilo, Hidroxibenzoato de propilo, Aroma de plátano, Tartrazina (E-102), Amarillo anaranjado S (E-110) y agua purificada, c.s.

PROPIEDADES

INISTOLIN PEDIATRICO EXPECTORANTE contiene un descongestionante y un expectorante, ambos de reconocida eficacia clínica. La Pseudoefedrina es un descongestionante de las mucosas del tracto respiratorio superior, especialmente de la mucosa y de los senos nasales. La Guaifenesina es un expectorante de reconocida eficacia clínica.

INDICACIONES

INISTOLIN PEDIATRICO EXPECTORANTE, está indicado en todas aquellas situaciones en las cuales se requiera la administración conjunta de un descongestionante de las vías respiratorias y de un expectorante.

POSOLOGIA**Niños de 6 a 12 años:** 5 ml, 3 veces al día.**Niños de 2 a 5 años:** 2,5 ml, 3 veces al día.

Beber un vaso de agua después de cada dosis de medicación.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

INISTOLIN PEDIATRICO EXPECTORANTE está contraindicado en pacientes que hayan demostrado hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Contraindicado en personas que hayan estado tratadas con antidepresivos tipo inhibidores de la monoaminoxidasa en las dos últimas semanas.

Los pacientes con hipertensión, hipertiroidismo, diabetes mellitus o trastornos cardíacos isquémicos, deben utilizar este medicamento únicamente por consejo médico.

Consulte a su médico si la tos persiste más de una semana, es recurrente o va acompañada de fiebre alta, dolor de cabeza o erupción de la piel.

No administrar a niños menores de 2 años sin consultar al médico.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por el médico.

Este medicamento contiene 3 g de sacarosa por cada 5 ml, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control como positivo.

Este medicamento contiene tartrazina (E-102) y amarillo anaranjado S (E-110) como excipientes, por lo que puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico.



PRUEBA CORREGIDA	ENTREGADO A OFICINA / VENTAS	DEVUELTO CON CAMBIOS	NUEVO ENVIO PRUEBAS	O.K. CLIENTE	CONTROL POSITIVOS
	16/2/2006				

CLIENTE: LABORATORIOS ALCALA FARMA

Fecha de la prueba:
16 - Febrero - 2006Modelo: Prospecto Inistolin Pediátrico Expectorante EI/F
Tamaño: 140 X 170 mm
Colores (Pantones): Negro

PLEGADO: No

PRUEBA 1

REVERSO



Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas, puede provocar dolor de cabeza, molestias de estomago y diarrea.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES

INISTOLIN PEDIATRICO EXPECTORANTE debe ser utilizado con precaución en aquellos pacientes bajo tratamiento con supresores del apetito, estimulantes tipo anfetamina y agentes hipotensores.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No son frecuentes. Pueden aparecer dolor y náuseas. En algunos pacientes la Pseudoefedrina puede causar ligero insomnio.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

El medicamento es seguro si no se exceden en las dosis recomendadas.

Los síntomas de una intoxicación por este preparado consisten, en la mayoría de los casos, en una ligera ansiedad, taquicardia y una ligera hipertensión. Estos síntomas son transitorios y habitualmente no requieren tratamiento.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91-562 04 20)

CONDICIONES DE CONSERVACION

Proteger de la luz. No refrigerar.

PRESENTACION

INISTOLIN PEDIATRICO EXPECTORANTE

Envase de 120 y 200 ml.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

**Consumer Healthcare**Plaza Xavier Cugat, 2, Edificio D
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)**Fabricante:**Alcalá Farma, S.L.
Carretera M-300, Km. 29,920
Alcalá de Henares
Madrid

EI/F

PRUEBA CORREGIDA	ENTREGADO A OFICINA / VENTAS	DEVUELTO CON CAMBIOS	NUEVO ENVIO PRUEBAS	O.K. CLIENTE	CONTROL POSITIVOS
	16/2/2006				