

PASTILLAS DR. ANDREU PARA LA TOS

Las PASTILLAS DR. ANDREU son un tratamiento clásico de la tos. La acción del bromhidrato de dextrometorfano sobre el centro de la tos las hace especialmente adecuadas frente a diversas manifestaciones de la misma.

Como complemento a esta acción antitusiva, las PASTILLAS DR. ANDREU incorporan un eficaz antiséptico bucofaríngeo.

Para facilitar su toma, se presentan en pastillas de agradable sabor a miel.

Las PASTILLAS DR. ANDREU, no tienen acción narcótica ni analgésica.

Composición cuantitativa

Cada pastilla contiene:

Dextrometorfano (D.C.I.) bromhidrato	2,00 mg
Benzoato sódico	15,00 mg
Sacarosa	1.402 mg
Glucosa líquida	974 mg

Color caramelo; esencia balsámico; esencia de nuez; esencia de limón y agua.

Indicaciones

Antitusivo, tratamiento sintomático de todas las formas improductivas de tos (tos irritativa, tos nerviosa).

Posología

Tomar 1 PASTILLA DR. ANDREU al aparecer la tos y dejarla disolver lentamente en la boca, a modo de caramelo. Si persiste la tos, continuar con 2 pastillas cada 1-2 horas.

En niños de 6 a 12 años, mitad de la dosis.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes, tos asmática o insuficiencia respiratoria.

Efectos secundarios y precauciones

A las dosis recomendadas no cabe la posibilidad de efectos secundarios ni tomar precauciones especiales. Sólo raramente puede aparecer somnolencia o molestias gastrointestinales, en cuyo caso es aconsejable reducir la posología.

En pacientes con enfermedades hepáticas administrar con precaución.

Interacciones

No debe administrarse junto con ciertos medicamentos antidepresivos (IMAO) por lo que, si se encuentra en tratamiento con alguno de ellos, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Intoxicación y su tratamiento

Dadas las características y dosificación de este producto es prácticamente imposible la intoxicación. Si a pesar de ello se produjera una sobredosificación (toma de varios envases) ésta se manifiesta con confusión, excitabilidad, inquietud y nerviosismo. La ingestión accidental de dosis muy altas puede producir en los niños un estado de sopor o alteraciones en la forma de andar. Estos efectos desaparecen con la inducción al vómito y lavado gástrico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental acuda al médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Advertencias para el paciente

Consulte a su médico si la tos persiste más de una semana o si va acompañada de fiebre alta, erupciones en la piel o dolor de cabeza continuo.

No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica o cuando va acompañada de abundantes secreciones. No administrar a niños menores de 2 años sin indicación médica.

Importante para la mujer

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar medicamentos. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento contiene 1,40 g de sacarosa por cada pastilla, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

Este medicamento contiene 0,97 g de glucosa por pastilla, lo que debe ser tenido en cuenta por los pacientes diabéticos.

Presentación

Caja con 24 pastillas.

Titular

QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.A.
Pau Claris, 196
08037 BARCELONA

Fabricante

Diététique et Pharmacie
Zone Industrielle de la Coudette
32290 AIGNAN (Francia)

Sin receta médica. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.