

Bexidermil Gel

Salicilato de trietanolamina

Composición

Cada gramo contiene:
Salicilato de trietanolamina (DCI) 100 mg
Excipientes: Trietanolamina, carbomer, propilenglicol, mentol, alcanfor, metilparaben y agua desionizada.

Propiedades

Analgésico antiinflamatorio externo que penetra y se absorbe rápidamente, produciendo un alivio inmediato del dolor.

Indicaciones

Dolor, inflamación y edema post-traumático en golpes, contusiones, esguinces. Inflamación de los ligamentos, de las articulaciones, inflamación de los tendones. Dolores reumatoideos, musculares y como complementario de las enfermedades reumáticas articulares.

Posología y modo de empleo

Aplíquese sobre la zona afectada 2 ó 3 veces al día, siendo aconsejable una aplicación adicional a la hora de acostarse. Debe realizarse un suave masaje hasta que se absorba.

Contraindicaciones

Antecedentes de hipersensibilidad a salicilatos. No utilizar sobre piel lesionada y mucosas. No utilizar en niños menores de 10 años.

Precauciones

Sólo para uso externo. Si el producto se usa de forma intensa y continuada, puede producirse una ligera descamación de la piel (peeling), reacción normal de la misma al uso de salicilatos que no impide continuar el tratamiento. Deberá utilizarse en aplicaciones locales, no en

grandes zonas. No utilizar durante el embarazo y lactancia sin consultar al médico.

Si aparece enrojecimiento, agravamiento de los síntomas o si el dolor persiste durante más de 7 días, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Evitar el contacto con los ojos.

Interacciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

Erupciones en el lugar de aplicación como reacción de hipersensibilidad.

Intoxicación y su tratamiento

En la práctica es muy improbable que en la administración por vía tópica se produzcan intoxicaciones. En caso de ingestión por vía oral, deberá darse aviso a un facultativo para que proceda a provocar el vómito y/o lavado

gástrico si lo juzga necesario o bien consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

Presentación Bexidermil Gel.

Tubo de 50 g

Otras presentaciones:
Bexidermil pulverizador sin gas. Frasco de 200 ml
Bexidermil Crema.
Tubo de 50 g

Sin receta médica.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN
MANTENERSE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

DA1036 - 02 - 0 - Ag

Fabricado por:
Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A.
Martorelles (Barcelona)

Laboratorios ISDIN, S.A.
Diagonal, 520
08006 Barcelona