

ANVERSO

**normosept**

1 g/100 ml solución cutánea

**Clorhexidina**

uso tópico

**COMPOSICIÓN CENTESIMAL**

CLORHEXIDINA (DCI) DIGLUCONATO ..... 1 g  
Excipientes (nonoxinol, alcohol isopropílico, agua purificada),  
c.s.p. .... 100 ml

**INDICACIONES**

Normosept, por sus propiedades antisépticas, actúa desinfectando la piel y las mucosas en caso de erosiones, heridas, obstetricia, etc. Actúa por contacto y posee una actividad antiséptica y un efecto antimicrobiano persistente contra un amplio espectro de microorganismos incluyendo bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.

La eficacia de normosept no disminuye significativamente por la presencia de sustancias orgánicas, como sangre.

**POSOLÓGIA Y NORMAS DE EMPLEO**

Para heridas y erosiones verter varias gotas en un trozo de algodón o gasa y frotar suavemente el área afectada, repitiéndose la operación después de un minuto. Si es necesario cúbrase la herida o erosión con una gasa estéril.

Para lavado de manos del personal sanitario echar unos 5 ml de normosept sobre las mismas, que se han lavado previamente con agua tibia y frotar rigurosamente prestando especial atención a las uñas y espacios interdigitales. Aclárese con agua y repetir la operación. Secar cuidadosamente.

**CONTRAINDICACIONES**

No debe aplicarse sobre el oído medio. Normosept está contraindicado en caso de sensibilización al preparado.

**INCOMPATIBILIDADES**

Es incompatible con jabones y sustancias aniónicas, yodo y sales de metales pesados.



## REVERSO

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Reacciones de hipersensibilidad. Se han dado casos de irritación de la conjuntiva y de ototoxicidad.

### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

Tanto a través de la piel intacta como por vía oral, el fármaco se absorbe muy escasamente.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

### **PRECAUCIONES**

No aplicar sobre el oído medio perforado. Jeringas y agujas desinfectadas con clorhexidina deben ser enjuagadas cuidadosamente con agua para inyección antes de ser utilizadas.

### **PRESENTACIÓN**

Normosept 1 g/100 ml solución cutánea: Frasco con 30 ml.

### **OTRAS PRESENTACIONES**

Deratín comprimidos para chupar.

CONSERVESE EN SITIO FRESCO Y PROTEGIDO DE LA LUZ

SIN RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL  
ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6 – 28760 Tres Cantos – Madrid (ESPAÑA)

