



Cortafriol[®] COMPLEX

ACCIONES

Cortafriol[®] COMPLEX es una avanzada formulación con acciones:

Analgésica: Por contener paracetamol es eficaz como analgésico, aliviando los dolores de cabeza.

Antipirética: Como el paracetamol es un eficaz antipirético, reduce la fiebre.

Antihistamínica: Reduce los estornudos, el escozor de ojos, la congestión y la descarga nasal excesiva.

INDICACIONES

Alivia los síntomas de los procesos catarrales y gripales, que cursan con fiebre, dolor leve o moderado, dolor de cabeza y congestión nasal.

COMPOSICION

Cada comprimido contiene: Paracetamol (DCI) 500 mg, Pseudoefedrina (DCI) (sulfato) 30 mg, Clorfenamina (DCI) (maleato) 2 mg.

Excipientes: Celulosa microcristalina, ácido esteárico, estearato magnésico, povidona, acetofalato de polivinilo, ftalato de dietilo, hipromelosa, Opadry[®] rojo (hipromelosa, etilcelulosa, ftalato de dietilo, Eritrosina (E-127), óxido de hierro amarillo (E-172), talco).

POSOLOGIA

Adultos: 1 comprimido cada 6-8 horas (3 a 4 comprimidos cada 24 horas). No se excederá de 6 comprimidos cada 24 horas.

Niños: de 6 a 12 años de edad, la dosis aconsejada es medio comprimido cada 6 horas. No excederá de 4 dosis cada 24 horas. No se recomienda la administración de Cortafriol[®] COMPLEX a niños menores de 6 años de edad. La administración de este preparado está supeditada a la aparición de los síntomas. A medida que éstos desaparezcan, debe suspenderse esta medicación. Estas dosis pueden ser modificadas por indicación facultativa.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula de Cortafriol[®] COMPLEX. Enfermedades hepáticas. Al igual que cualquier medicamento, se aconseja utilizarlo sólo bajo recomendación médica durante el embarazo.

ADVERTENCIAS

Los pacientes con hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y del tiroides, diabetes, asma, glaucoma, enfisema, enfermedad pulmonar crónica, dificultad para respirar, dificultad para orinar debido a hipertrofia prostática, o que estén en tratamiento con fármacos para la depresión o hipertensión arterial, no deben tomar este medicamento sin consultar previamente al médico.

Importante para la mujer: Si está usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo.

PRECAUCIONES

Cortafriol[®] COMPLEX puede producir una sedación que deberá tenerse en cuenta, en caso de conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa.



El consumo de bebidas alcohólicas puede aumentar la somnolencia, por esta razón deberá evitarse el alcohol. En pacientes con insuficiencia hepática y/o renal, anemia, afecciones cardíacas o pulmonares, evitar tratamientos prolongados. No exceder la dosis recomendada. Se aconseja consultar al médico para tratamientos de más de 10 días de duración.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Con las dosis recomendadas son poco frecuentes. Puede producir somnolencia. El paracetamol, uno de los componentes de Cortafriol[®] COMPLEX, con dosis altas o en tratamientos prolongados puede producir hepatotoxicidad. Raramente pueden aparecer erupciones cutáneas y alteraciones hematológicas.

INTERACCIONES

Cortafriol[®] COMPLEX puede potenciar la acción de los sedantes, hipnóticos, antihistamínicos, analgésicos y alcohol.

El paracetamol puede aumentar la toxicidad del cloramfenicol.

En caso de tratamientos con anticoagulantes orales, se puede administrar ocasionalmente como analgésico de elección.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

En caso de sobredosis grave, deberá avisarse al médico. No exceder la dosis recomendada porque a dosis altas se puede producir nerviosismo, mareo o somnolencia. La sintomatología por sobredosis de paracetamol incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia y dolor abdominal. Si se ha ingerido una sobredosis debe acudir rápidamente a un centro médico, aunque no haya síntomas, ya que éstos, muy graves, se manifiestan generalmente a partir del tercer día después de su ingestión.

Se considera sobredosis de paracetamol, la ingestión de una sola toma de más de 6 g en adultos, equivalente a 12 comprimidos de Cortafriol[®] COMPLEX, y más de 100 mg por kg de peso en niños. Pacientes en tratamiento con barbitúricos o alcohólicos crónicos, pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una sobredosis de paracetamol. El tratamiento consiste en aspiración y lavado gástrico, carbón activado vía oral, administración intravenosa de N-Acetilcisteína a dosis adecuadas y, si es preciso, hemodiálisis. El período en el que el tratamiento ofrece la mayor garantía de eficacia se encuentra dentro de las 12 horas siguientes a la ingestión de la sobredosis.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

ADMINISTRACION

Cortafriol[®] COMPLEX se administra por vía oral. Se recomienda ingerir los comprimidos con un poco de agua.

PRESENTACION

Envase con 12 comprimidos (983882-E.F.P.)

Logo Sanofi-Aventis otc
División OTC de



SANOFI AVENTIS S.A.
Josep Plá, 2
08019 Barcelona

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

Sin receta médica