



CLOROFILA SIT 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Extracto de clorofila

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 6 días, debe consultar al médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es CLOROFILA SIT y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar CLOROFILA SIT.
3. Cómo tomar CLOROFILA SIT.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de CLOROFILA SIT
6. Información adicional.

1. QUÉ ES CLOROFILA SIT Y PARA QUÉ SE UTILIZA

CLOROFILA SIT pertenece a un grupo de medicamentos para tratamiento oral local.

CLOROFILA SIT está indicado en aquellos casos en que se pretenda eliminar el mal olor de la boca (halitosis), como los ocasionados por el consumo de tabaco y los producidos después de la ingestión de bebidas alcohólicas y de alimentos con fuerte olor (ajo, cebolla, etc.) así como ciertos olores corporales.

2. ANTES DE TOMAR CLOROFILA SIT

No tome CLOROFILA SIT:

Si es alérgico (hipersensible) a la clorofila o a cualquiera de sus demás componentes.

Tenga especial cuidado con CLOROFILA SIT:

Como la clorofila es un componente natural de todos los vegetales verdes que tomamos abundantemente no se requiere ningún cuidado especial en la toma de CLOROFILA SIT.

Si el mal olor de boca es debido a otras causas (dentadura, caries, infecciones bucales o respiratorias) debe consultar a su médico.

Si el mal olor de boca debido a las indicaciones antes señaladas no desaparece en pocos días, debe consultar a su médico o farmacéutico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Toma de CLOROFILA SIT con los alimentos y bebidas:

CLOROFILA SIT no produce interferencias con la toma de alimentos o bebidas. Por lo tanto, puede tomarse tanto en ayunas como en unión de alimentos y bebidas.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas:

CLOROFILA SIT no produce ningún efecto sobre la conducción y uso de máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de CLOROFILA SIT:

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Este medicamento puede producir reacciones alérgicas porque contiene negro brillante (E-151). Puede provocar asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

3. CÓMO TOMAR CLOROFILA SIT

Siga exactamente las instrucciones de administración de CLOROFILA SIT indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Su médico o farmacéutico le indicará la duración de su tratamiento con CLOROFILA SIT.

Adultos:

En los adultos el tratamiento recomendado es de 2 comprimidos dos o tres veces al día. En caso necesario la dosis diaria es de hasta 6 comprimidos al día.

Los comprimidos de CLOROFILA SIT pueden ingerirse solos o con un poco de líquido, pudiendo tragarse o chuparse (**en este caso se produce una coloración verde de dientes y lengua que tarda en desaparecer**).

Si estima que la acción de CLOROFILA SIT es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si toma más CLOROFILA SIT de la que debiera:

En caso de toma excesiva o accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar CLOROFILA SIT:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome sus comprimidos cuando le corresponda.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, CLOROFILA SIT puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Se han notificado los siguientes efectos adversos, cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: coloración verdosa de los dientes, lengua, heces y orina o coloración amarilla o negra de la lengua, diarrea.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE CLOROFILA SIT

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice CLOROFILA SIT después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de CLOROFILA SIT

- El principio activo es extracto de clorofila.
Cada comprimido recubierto contiene 20 mg de extracto de clorofila, expresado en clorofilina sódica.
- Los demás componentes son:
Esencia de menta, sacarosa, talco, ácido esteárico, dióxido de sílice coloidal y colorante verde (caroteno 1% , azul patente CI 42051 y negro brillante CI 28440 (E-151)).

Aspecto del producto y contenido del envase

Comprimidos recubiertos, redondos de color verde.

Blister de PVC/Aluminio. Envases conteniendo 10 y 50 comprimidos recubiertos.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Laboratorio Farmaceutico S.I.T. s.r.l.

Via Cavour, 70

27035 Mede (Pavía) – Italia

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

Desma Laboratorio Farmacéutico, S.L.

Cuatro Amigos 7, esc. 2ª, 1ª D.

28029 Madrid.

Este prospecto ha sido revisado Junio 2009