

# **SAL DE FRUTA ENO NARANJA**

(14-oct-03)  
VIA ORAL

## **COMPOSICIÓN**

Cada sobre contiene: Bicarbonato sódico: 2.285 g; Ácido cítrico: 2.155 g; Carbonato sódico anhidro: 0.500g;

Excipientes:

Sacarina sódica: 0.008 g; Aroma naranja; Amarillo anaranjado (E-110).

## **PROPIEDADES**

SAL DE FRUTA ENO NARANJA tiene acción antiácida

## **INDICACIONES**

Alivio sintomático de las molestias estomacales relacionadas con la hiperacidez (acidez de estómago, ardores). Digestiones pesadas, incluyendo las molestias producidas por comidas apresuradas.

## **POSOLOGIA**

ADULTOS: 1 ó 2 sobres disueltos en agua, repitiendo si es necesario cada ocho horas.

NIÑOS: Consultar al médico.

## **CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**

Consulte a su médico si padece hipertensión, insuficiencia cardíaca o renal, tiene propensión a la retención de aguas (edemas), o en general si está siguiendo un tratamiento con diuréticos o una dieta con poca sal ( este preparado contiene 810 mg de sodio por dosis). No utilizarlo de forma continuada durante más de 2 semanas sin consultar al médico.

Este medicamento contiene amarillo anaranjado (E-110) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluyendo asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

## **IMPORTANTE PARA LA MUJER**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

## **EFECTOS SECUNDARIOS**

Riesgo de retención de agua ( edema). Flatulencia y eructos.

## **INTERACCIONES**

Consulte a su médico si está tomando otra medicación, porque los antiácidos pueden modificar la acción de otros medicamentos ( tetraciclinas, anfetaminas, quinidina, carbonato de litio, sales de hierro). No tomarlo con leche o calcio.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de sobredosificación o ingestión accidental con SAL DE FRUTA ENO NARANJA, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

## **PRESENTACIONES**

Envases con 10 sobres monodosis de 5 g.

Frasco de 150 g de polvo efervescente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

**SIN RECETA MEDICA**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,S.A.

C/ severo Ochoa,2 – 28760. Tres cantos (Madrid)

Fabricado por:

Smithkline Beecham,S.A.

Ctra. Ajalvir Km.2.500

28806 Alcalá de henares. ( Madrid)